Состав

Индол-3-карбинол – 200,0 мг, прутняка экстракт – 100,0 мг, лактоза — 88,0 мг, кальция стеарат — 8,0 мг, аэросил-4,0 мг.

Описание

Индол-3-карбинол (I3C) оказывает выраженный положительный эффект на дисгормональные заболевания молочных желез. I3C способствует избирательному ингибированию роста трансформированных клеток и индукции апоптоза. Антипролиферативное действие I3C реализуется несколькими механизмами, основной из которых — нормализация метаболизма и баланса эстрогенов, снижение образования патологического метаболита 16ά-гидроксиэстрона, обладающего выраженными канцерогенными свойствами.

I3C блокирует как гормонзависимые, так и гормоннезависимые пути возникновения патологической клеточной пролиферации — нейтрализует действие эпидермального и инсулиноподобного факторов роста, стимулирующих клеточную пролиферацию в молочных железах и матке, ингибирует эффект противовоспалительных цитокинов. I3C восстанавливает работу генов противоопухолевой защиты BRCA, блокирует синтез онкобелка E7 в эпителиальных клетках, инфицированных вирусом папилломы человека.

Прутняк обыкновенный (Agnus Castus), обладая допаминергическим эффектом, способствует снижению уровня пролактина, что опосредованно приводит к установлению физиологического соотношения женских половых гормонов (эстрогенов и прогестерона), улучшению морфофункционального состояния молочных желез, снижению образования соединительной ткани в молочных железах и предотвращению расширения молочных протоков, купированию болевого синдрома, нормализации менструального цикла, смягчению симптомов предменструального синдрома, улучшению психоэмоционального состояния.

Показания

Рекомендуется как дополнительный источник индол-3-карбинола, биологически активных соединений прутняка обычного. Способствует нормализации метаболических процессов в молочных железах у женщин. Маммодол назначают с целью улучшения функционального состояния у женщин при фиброзно-кистозной мастопатии; мастодинии; предменструальном синдроме; нарушениях менструального цикла; с целью профилактики развития гиперпластических процессов в молочных железах.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, лактация, дети до 14 лет. Не рекомендуется одновременный прием продуктов, снижающих кислотность желудка.

Способ применения и дозы

Женщинам по 1-2 капсулы в сутки во время или после приема пищи. Запивать достаточным количеством воды. Курс приема – 3 месяца. В дальнейшем периодичность и длительность применения согласовывать с врачом.

Срок годности

2 роки.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО ВТФ Фармаком, Украина.