

Склад

1 капсула містить активні інгредієнти:

- екстракт коренів і кореневищ лопуха справжнього (*Arctium lappa*), порошкоподібний - 50,00 mg (мг);
- екстракт трави мучниці звичайної (*Arctostaphylos uva-ursi Spreng.*), порошкоподібний - 30,00 mg (мг);
- екстракт плодівих тіл березового гриба (*Inonotus obliquus*), порошкоподібний - 30,00 mg (мг)
- екстракт плодів шипшини травневої (*Rosa majalis Hermm.*), порошкоподібний - 20,00 mg (мг);
- екстракт коренеплодів і листя петрушки городньої (*Petroselinum sativum*), порошкоподібний - 20,00 mg (мг)
- екстракт коренів з кореневищами пирію повзучого (*Agropyrum resens*), порошкоподібний - 20,00 mg (мг);
- лікопін (*Lycopene*) з насіння плодів томатів їстівних (*Lycopersicon esculentum*) - 20,00 mg (мг)
- екстракт незрілих плодів чорного горіха (*Juglans nigra*), порошкоподібний - 10,00 mg (мг)

Допоміжні речовини: наповнювач: мальтодекстрин, оболонка капсули: желатин, барвник титану діоксид.

Властивості

Функціональні властивості дієтичної добавки «Анеза» / «Aneza», капсули обумовлені фізіологічною активністю біологічно активних речовин, що входять до складу її активних інгредієнтів рослинного походження.

Екстракт коренів і кореневищ лопуха справжнього (*Arctium lappa*).

Корені з кореневища лопуха справжнього містять інулін, ефірну і жирні олії, ситостерин, стигмастерин, глікозиди, лактон Арктін, слизу, смоли, органічні кислоти (кавову, пальмітинову, лінолеву, стеаринову), гіркі, дубильні, мінеральні та інші речовини.

Біологічно активні сполуки мають протизапальні, сечогінні, жовчогінні, потогінні і гіпоглікемічні властивості, збільшують вміст глікогену в печінці, покращують обмін речовин. Застосовуються при ревматизмі, при ново-утвореннях, в тому числі при кістозних захворюваннях нирок.

Екстракт трави мучниці звичайної (*Arctostaphylos uva-ursi* Spreng.).

Трава мучниці звичайної містить глікозид арбутин і метиларбутин, які гідролізуються в глюкозу, гідрохінон і метілгідрохінон, дубильні речовини пірогаллової групи, флавоноїди (гіперозид, кверцетин, кверцитрин, изокверцитрин, міріцитрін, мирицетин), галотаніни, урсолову, хінну, елагову, мурашину, аскорбінову кислоти, ефірні масла, азотисті сполуки, в тому числі незамінні амінокислоти, макро- і мікроелементи (мідь, марганець, кобальт, цинк, молібден, йод).

Біологічно активні сполуки виявляють антисептичну та сечогінну дію. Використовуються при захворюваннях і спазмах нирок і сечовивідних шляхів (пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, цистит, уретрит, кахексія нирок), при гастритах, проносах, млявому травленні, що виникають на тлі підвищеної кислотності шлункового соку, а також як заспокійливий засіб при нервових розладах.

Екстракт плодів гриба березового гриба (*Inonotus obliquus*).

Плодові тіла березового гриба містять біологічно активні сполуки, які проявляють антибактеріальні, антифунгальні, протизапальні, гіпотензивні та седативні властивості. У традиційній і народній медицині застосовуються при серцево-судинних захворюваннях, туберкульозі легенів, захворюваннях печінки і шлунка, для поліпшення травлення, при подагрі, гострих респіраторних інфекціях, шлунково-кишкових кольках, діареї, нефриті, циститах, неврастенії, запамороченні і ревматизмі, як протипухлинний засіб, покращує загальний стан хворих при новоутвореннях.

Екстракт плодів шипшини травневої (*Rosa majalis* Hermm.).

Плоди шипшини травневої містять аскорбінову кислоту, каротин, вітамін Р, вітаміни В₁, В₂, В₅, С, РР, К, D, Е, флавоноїди (гіперозид, астрагалін, кверцитрін, изокверцитрин, кемпферол), катехіни (епігаллокатехін, галлокатехін, епігаллокатехінгаллат, епікатехінгалла), фенолкіслоти, фітонциди, пектинові речовини, вуглеводи, органічні кислоти, в тому числі лимонні, яблучні, антоціанові з'єднання, дубильні речовини, пектини, ефірні масла, солі калію, кальцію, заліза, марганцю, фосфору, магнію, міді і алюмінію.

Біологічно активні сполуки мають протицингові, антисклеротичні, протизапальні, сечогінні та жовчогінні властивості, активізують ферментні системи і окислювально-відновні процеси в організмі, позитивно впливають на вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, зменшують ламкість і проникність капілярів, підвищують опірність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищують рівень секреції

жовчі, збільшують діурез.

Використовуються для підвищення опорності організму до інфекційних захворювань, при інтоксикації процесу, при анацидному гастриті, з метою посилення моторної функції шлунка, при здутті кишечника і інших хворобах шлунково-кишкового тракту, при недокрив'ї, кровотечах, каменях у печінці та нирках, при запальних процесах печінки і жовчних шляхів (хронічних гепатитах, холециститах, холангітах), захворюваннях сечового міхура і нирок (нефриті, нефропатії та ін.).

Екстракт коренеплодів і листя петрушки городньої (*Petroselinum sativum*).

Коренеплоди і листя петрушки городньої містять ефірну олію, до складу яких входить апіол, апіолова кислота, миристицин, алілтетраметоксібензол, пінен, флавоноїди (апіїн, апігенін, лютеолін-7-апіоглюкозид, кверцетин, кемпферол, хрізоеріол 7-апіофуранозидоглюкозид, ізорамнетін-3, 7-диглюкозид, вербіозид, нарингенин), кумарини, піридоксин, ніотинова і аскорбінова кислота, жиророзчинні вітаміни: А і К, макро- і мікроелементи: калій, кальцій, залізо, фосфор і ін.

Біологічно активні сполуки підсилюють діурез, підвищують тонус гладких м'язів матки, кишечника і сечового міхура, збуджують апетит і покращують травлення, пригнічують процеси бродіння в кишечнику, розчиняють камені і пісок в сечовивідних шляхах, виявляють жовчогінну, спазмолітичну і потогінну дію, мають антимікробну активність проти *S. aureus*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *K. Pneumonia*.

Екстракт коренів з кореневищами пирію повзучого (*Agropyrum repens*).

Коріння з кореневищами пирію повзучого містять полісахарид трітицин, слизові речовини, фруктозу, манить, мезоінозит, левульози, фенольні сполуки авенін, жирні та ефірні олії, тритерпенові, агронірен, яблучну кислоту, вітамін С, каротиноїди, кремнієву кислоту і інші речовини

Біологічно активні сполуки мають обволікаючі, пом'якшувальні, протизапальні і сечогінні властивості, сприяють відновленню порушеного обміну речовин.

Використовуються при захворюваннях сечостатевої системи, подагрі, ревматизмі, сечокам'яної хвороби, циститах, нефритах, запаленні передміхурової залози, при хворобах шлунково-кишкового тракту, коліках, гастритах, ентеритах, холециститах, каменях в жовчному міхурі, при захворюваннях шкіри, порушеннях обміну речовин, анеміях.

Лікопін (*Lycopene*) з насіння плодів томатів їстівних (*Lycopersicon esculentum*).

Лікопін з насіння плодів томатів їстівних - каротину пігмент, на відміну від бета-каротину, не є провітамін А. Він має виражені антиоксидантні, радіопротекторними, гіполіпідемічними і антипроліферативними властивостями, захищає клітинні мембрани від окислення активними формами кисню і окису азоту.

Після вживання лікопін накопичується в передміхуровій залозі, печінці, нирках, молочних залозах, надниркових залозах, шлунково-кишковому тракті, легенях і шкірі.

Лікопін має високу антиоксидантну активність, стимулює утворення міжклітинних контактів, стабілізує геном ДНК, пригнічуючи мутагенез і канцерогенез, запобігає розвитку новоутворень, атеросклерозу, хвороб серцево-судинної системи.

Використовується при захворюваннях серцево-судинної системи, передміхурової і молочних залоз, для підвищення імунітету.

Екстракт незрілих плодів чорного горіха (*Juglans nigra*).

Незрілі плоди чорного горіха містять біофлавоноїди, дубильні речовини, глікозиди, юнозід, ефірні масла, фітонциди, органічні кислоти, хинон юглон, вітаміни С, А, В₁, В₂, В₆, РР, Е, макро- і мікроелементи: марганець, залізо, калій, кремній, магній, селен, кобальт, фосфор, йод.

Біологічно активні сполуки виявляють антиоксидантні, імуностимулюючі, спазмолітичні, судинорозширювальні, в'язучі, антибактеріальні, антигельмінтні, сечогінні, тонізуючі, кровоспинні і протипухлинні властивості, посилюють моторну функцію шлунка і кишечника, позбавляють від паразитарних захворювань, знижують вміст цукру в крові.

Юглон має високу антибактеріальну активність проти більшості хвороботворних мікроорганізмів.

Використовується при захворюваннях щитовидної залози, як загальнозміцнюючий і тонізуючий засіб, при нервових розладах, як ранозагоювальний, протизапальний і кровоочисний засіб, при гельмінтозах, анемії, артеріальної гіпо- та гіпертензії, пієлонефриті, тромбофлебіті, туберкульозі, захворюваннях печінки, кістках, гіперплазії ендометрію яєчників з рясними кровотечами, грибкових і вірусних інфекціях, покращує загальний стан організму при наявності новоутворень.

Комплекс біологічно активних сполук, які входять до складу активних інгредієнтів «Анеза» / «Aneza» капсули, має антиоксидантні, спазмолітичні,

протизапальні, протибактеріальні і протигельмінтні властивості, виявляє діуретичний і протиабраковий ефекти, сприяє запобіганню зростання кістозних утворень в нирках.

Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо застосування

По рекомендації лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин з метою поліпшення загального стану в осіб з кістою нирок.

Рекомендації щодо застосування

По рекомендації лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин з метою поліпшення загального стану в осіб з кістою нирок.

Спосіб застосування та дози

Дітям старше 12 років приймати по 1 капсулі 3 рази на добу, дорослим - по 1-2 капсули 3 рази на добу. Капсули слід ковтати не розжовуючи запиваючи достатньою кількістю рідини.

Термін застосування визначається індивідуально з урахуванням характеру та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого ефекту і сприйнятливості. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Застереження

Регулярне щоденне споживання особливо важливо для поліпшення загального стану в осіб з кістами нирок. Рекомендується застосовувати повноцінний і збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не потрібно використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Вагітність і період лактації, діти до 12 років, підвищена чутливість до складових компонентів, гломерулонефрит або пієлонефрит в стадії загострення.