Состав

1 капсула содержит:

Активные ингредиенты:

- индол-3-карбинол - 200 мг;
- экстракт зеленого чая - 82 мг (что эквивалентно эпигаллокатехин-3-галлат - 45 мг).

Вспомогательные вещества: наполнители (двуокись кремния аморфный, магния стеарат).

Оболочка капсулы - желатин.

Описание

«Эпигалин» осуществляет комплексное воздействие на организм человека, который проявляется в торможении патологических гиперпластических процессов в гормон-зависимых органах и тканях женской (молочные железы, эндо- и миометрий и шейка матки, яичники) и мужской (предстательная железа) репродуктивной системы, подавляет патологический рост и митоз клеток в органах и тканях женской репродуктивной системы, уменьшает развитие папилломатоза и степень дисплазии шейки матки, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Свойства

Индол-3-карбинол является биологически активным веществом экстракта семейства крестоцветных, блокирует гормон-зависимые и гормон-независимые механизмы, которые активируют патологический клеточный рост в тканях молочной железы, матки и предстательной железы. За счет усиления активности ферментов системы цитохрома Р-450, нормализует баланс эстрогенов, подавляет образование проканцерогенного 16а-гидроксиестрона и способствует смещению соотношения метаболитов женских половых гормонов - эстрогенов в пользу образования 2-С-гидроэстрона; предупреждает пролиферацию клеток у эстрогенчувствительных тканей; индуцирует процессы апоптоза в патологически измененных клетках; нейтрализует действие ростовых факторов, которые стимулируют развитие опухолей в гормонозависимых органах репродуктивной системы; обладает мощным противовирусным эффектом в отношении ВПЧ, поскольку блокирует синтез проонкогенного белка Е7 в эпителиальных клетках, инфицированных этим вирусом, вызывает выборочную гибель клеток (апоптоз),

зараженных ВПЧ, в том числе и клеток, которые уже подверглись вирогенной опухлевой трансформации.

Эпигаллокатехин-С-галлат является биологически активным веществом экстракта зеленого чая, активирует фагоцитоз, стимулирует завершенность фагоцитоза, увеличивает число фагоцитирующих клеток, обладает выраженным ангиостатичным действием (подавляет патологический рост новых сосудов), способствует уменьшению роста новообразований; подавляет инвазивную активность клеток эндометрия; подавляет активность ЦОГ-2 и простагландинов. Характеризуется способностью тормозить рост сосудов в миоматозных узлах, препятствует проникновению клеток эндометрия в мышечный слой матки, то есть является эффективным средством в борьбе с аденомиозом.

Показания

Принимать по рекомендации врача как дополнительный источник индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлат с целью нормализации метаболических процессов в репродуктивных органах женщин и молочных железах, а также предстательной железе у мужчин. «Эпигалин» может быть рекомендован врачом при лейомиоме матки, мастопатии, гиперплазии эндометрия, эндометриозе (в том числе аденомиоз, эндометриоидных кистах), гиперплазии предстательной железы при заболеваниях, ассоциированных вирусом папилломы человека (дисплазия шейки матки, аногенитальные кондиломы).

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость;
- беременность;
- период лактации.

Меры предосторожности

Не рекомендуется употреблять лицам, принимающим продукты, снижающие кислотность желудочного сока.

Способ применения и дозы

Принимать взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды.

Продолжительность применения и необходимость повторного курса определяет врач индивидуально.

Обычно, длительность применения при гиперпролиферативных процессах в репродуктивных органах женщин и предстательной железе у мужчин составляет 6 месяцев, а при нарушении метаболических процессов в молочных железах и папилломатозе - 3 месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 4 °C до 25 °C в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 60 капсул в упаковке.

Срок годности

2 года с даты изготовления.

Производитель

BHI-Biohealth int. GMBH, Германия.