

Состав

действующее вещество: фладексан;

1 г мази содержит фладексана в пересчете на содержание суммы флавоноидов 30% 20 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, пропиленгликоль, стеариновая кислота, эмульгатор № 1, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Код АТХ D11A X.

Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения, содержит фладексан - экстракт травы десмодиуму канадского семейства бобовых.

Препарат оказывает местное противовоспалительное, обезболивающее и противоаллергическое действие, обладает антиаллергические и десенсибилизирующие свойства, проявляет противовирусную активность в отношении вирусов лишая пузырьчатого (герпеса простого) и опоясывающего - Herpes simplex i Herpes zoster, а также стимулирует репаративные процессы в коже.

Фармакокинетика

При нанесении на кожу компоненты мази не оказываются в сыворотке крови.

Показания

Для местного лечения всех форм и стадий псориаза, аллергического, атопического (особенно в подострый период и в период угасания процесса), периоральный и себорейного дерматитов, нейродермита, фотодерматозов,

токсидермий, а также лишая пузырьчатого (герпеса) различной локализации (губной, щечной, носовой, ушной, генитальной) и опоясывающего лишая.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные отсутствуют.

Особенности применения

В связи с наличием в составе метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216), препарат может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Лечение препаратом не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям внешне, местно.

Дерматиты различного происхождения, пузырьчатый (герпес) и опоясывающий лишай. Мазь наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженный участок кожи 2-4 раза в сутки, желательно с момента появления первых признаков заболевания. Продолжительность курса лечения - 5-14 дней.

Псориаз. Мазь наносить на пораженный участок кожи под восковую бумагу 1-2 раза в сутки. Курс лечения - 10-30 дней и более, особенно в случае великобляшковых форм.

В зависимости от результатов терапии и в случаях рецидивов курс лечения можно повторять 2-3 и более раз.

Дети

Лекарственное средство можно применять детям.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции

В некоторых случаях возможно появление жжения, которое исчезает после временного прекращения применения препарата.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 15 г в тубе в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).