

## **Состав**

*действующее вещество:* фладексан;

1 г мази содержит фладексана в пересчете на содержание суммы флавоноидов 30% 20 мг;

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий, пропиленгликоль, стеариновая кислота, эмульгатор № 1, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, со специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Дерматологические средства. Код АТХ D11A X.

## **Фармакодинамика**

Лекарственное средство растительного происхождения, содержит фладексан - экстракт травы десмодиуму канадского семейства бобовых.

Препарат оказывает местное противовоспалительное, обезболивающее и противоаллергическое действие, обладает антиаллергические и десенсибилизирующие свойства, проявляет противовирусную активность в отношении вирусов лишая пузырьчатого (герпеса простого) и опоясывающего - Herpes simplex i Herpes zoster, а также стимулирует репаративные процессы в коже.

## **Фармакокинетика**

При нанесении на кожу компоненты мази не оказываются в сыворотке крови.

## **Показания**

Для местного лечения всех форм и стадий псориаза, аллергического, атопического (особенно в подострый период и в период угасания процесса), периоральный и себорейного дерматитов, нейродермита, фотодерматозов,

токсидермий, а также лишая пузырьчатого (герпеса) различной локализации (губной, щечной, носовой, ушной, генитальной) и опоясывающего лишая.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Данные отсутствуют.

### **Особенности применения**

В связи с наличием в составе метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216), препарат может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Лечение препаратом не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Применять взрослым и детям внешне, местно.

Дерматиты различного происхождения, пузырьчатый (герпес) и опоясывающий лишай. Мазь наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженный участок кожи 2-4 раза в сутки, желательно с момента появления первых признаков заболевания. Продолжительность курса лечения - 5-14 дней.

*Псориаз.* Мазь наносить на пораженный участок кожи под восковую бумагу 1-2 раза в сутки. Курс лечения - 10-30 дней и более, особенно в случае великобляшковых форм.

В зависимости от результатов терапии и в случаях рецидивов курс лечения можно повторять 2-3 и более раз.

## **Дети**

Лекарственное средство можно применять детям.

## **Передозировка**

Случаи передозировки не описаны.

## **Побочные реакции**

В некоторых случаях возможно появление жжения, которое исчезает после временного прекращения применения препарата.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 15 г в тубе в коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).