Состав

12 млрд. живых бактерий следующих 10 штаммов: Lactobacillus acidophilus (La-14), Lactobacillus rhamnosus (Lr-32), Bifidobacterium bifidum (Bb-02), Bifidobacterium lactis (Bl-04), Bifidobacterium breve (Bb03), Lactobacillus paracasei (Lpc-37), Lactobacillus plantarum (Lp-115), Lactobacillus casei (Lc-11), Lactococcus lactis (Ll-23), Streptococcus thermophilus (St-21), витамин С - 12 мг, фруктоолигосахариды - 5 мг; вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая (Е 460), магния стеарат (Е 572), гидроксипропилметилцеллюлоза (Е 464), титана диоксид (Е 171).

Описание

Капсулы Пролактон могут быть рекомендованы врачом в рационах диетического питания для нормализации процесса пищеварения, восстановления баланса нормальной микрофлоры кишечника.

Пролактон содержит сбалансированное сочетание молочно-кислых бактерий, фруктоолигосахаридов (служат питанием для пробиотических бактерий) и комплекса пищеварительных ферментов, контролирующих и поддерживают баланс кишечной флоры, способствуют улучшению пищеварения, способствуют защите от патогенных бактерий, повышению иммунитета и детоксикации.

Благодаря микрокапсулированию жизнеспособность бактерий не нарушается при прохождении через верхние отделы желудочно-кишечного тракта, обеспечивает стабильное прохождение бактерий к месту их действия - тонкому и толстому кишечнику. Колонизационная способность культуры усиливается за счет комбинации с Streptococcus thermophilus.

Предостережение

Не превышать рекомендуемую дозу для ежедневного потребления. Не применять при индивидуальной непереносимости к одному или нескольким компонентам диетической добавки. Рекомендуется проконсультироваться с врачом для детальной информации беременным женщинам, женщинам в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Употреблять детям старше 3 лет по 1 капсуле в сутки, взрослым - по 2 капсулы в сутки, желательно во время приема пищи. Во время лечения антибиотиками целесообразно принимать Пролактон за 2-3 часа до или после введения

антибиотиков и продолжать принимать в течение не менее 7 дней после прекращения лечения антибиотиком.

Рекомендуемый срок применения: продолжительность употребления согласовывается с врачом индивидуально.

Упаковка

15 капсул в блистере, по 2 блистера в упаковке.

Производитель

Actimedix S.R.O., Чехия.