Состав

Содержимое 1 капсулы:

Lactobacillus acidophilus - 5x108 КОЕ/г;
Lactobacillus rhamnosus – 9x108 КОЕ/ч;
Lactobacillus plantarum - 2x107 КОЕ/ч;
Lactobacillus casei - 4x108 КОЕ/ч;
Bifidobacterium bifidum - 5x108 КОЕ/ч;
Bifidobacterium longum - 8x108 КОЕ/ч;
Saccharomyces boulardii – 3x107 КОЕ/ч;
селен – 0,05 мг;
олигофруктоза – 40 мг;
инулин – 450 мг.

Показания

Рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания, как дополнительный источник жизнеспособных пробиотических микроорганизмов с целью нормализации микрофлоры кишечника, при дисбиозах различного генеза; в период повышенного риска развития кишечных расстройств (в том числе во время путешествий), при синдроме раздраженного кишечника и других функциональных нарушениях пищеварительной системы; для восстановления естественной защиты организма после перенесенных заболеваний, уменьшение выраженности и частоты побочных эффектов при антибиотико-, гормональной, лучевой и химиотерапии, в комплексном лечении острых и хронических заболеваний, метаболических расстройств (в т.ч. избыточного веса), грибковых заболеваний, для профилактики остеопороза, диселементозов и гиповитаминозов, при аллергических реакциях, гормональной дисфункции (нарушениях менструального цикла, в комплексном лечении бесплодия, импотенции различного генезиса, мастопатии), угревой сыпи, для снижения риска возникновения осложнений в комплексном лечении новообразований, дезинтоксикации организма, выведении тяжелых металлов, рекомендуется при психо-эмоциональных и физических стрессах.

Предостережение

Повышенная чувствительность к компонентам, беременность, период лактации.

В связи с наличием риска системной колонизации Saccharomyces boulardii у пациентов с ослабленной иммунной системой (например ВИЧ-инфекции, при

трансплантации органов, лейкемии, злокачественных опухолях, лучевой терапии, химиотерапии, при длительном приеме высоких доз кортикостероидов), а также пациентам с наличием центрального венозного катетера следует применять после консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Средство не влияет на способность управлять автомобилем или другими механизмами.

Способ применения и дозы

Капсулы принимать внутрь, глотая целыми и запивая достаточным количеством жидкости (1 стакан питьевой воды). Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 капсуле 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Рекомендуемый срок приема:

- острая диарея: 3-5 суток;
- хронические воспалительные заболевания пищеварительного тракта различной этиологии и функциональные расстройства кишечника - до 1-1,5 месяцев;
- антибиотикоассоциированная диарея и ее профилактика: принимать в схемах с антибиотиками с первого дня применения антибиотиков;
- дисбиоз различного генеза, хронический диарейный синдром: 10-15 суток;
- диарея путешественника: начало применения: за 5 дней до прибытия по 1 капсуле в день в течение всего путешествия, до его окончания;
- другие состояния, сопровождающиеся общими проявлениями нарушений функционирования организма - 15-30 дней.

В дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом индивидуально.

Курс приема зависит от характера и течения заболевания.

Для закрепления полученного клинического эффекта курс можно повторить после 10-14 дневного перерыва.

При отсутствии полной нормализации микрофлоры назначают поддерживающие дозы препарата (1 капсулу в день) в течение 1-1,5 месяца.

При заболеваниях, протекающих с рецидивами, целесообразны повторные курсы приема.

Перед применением (в т.ч. приема детьми) рекомендуется посоветоваться с врачом.

Срок годности

2 года с даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2 °C до 25 °C.

Упаковка

По 10 кишечнорастворимых капсул (по 500 мг) в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.

Производитель

ООО Элемент Здоровья, Украина.