

Состав

Водно-спиртовой экстракт растительного сырья: диоскореи корневища; березового гриба; родиолы холодной корневища с корнями; капусты брокколи, как источник индол-3-карбинола; прутняка обычного плодов; экстрагент-спирт этиловый 40% и 48%.

Показания

- циклическая масталгия;
- мастодиния (нагрубание и болезненность молочных желез);
- фиброзно-кистозная мастопатия, вызванная выраженным повышением концентрации пролактина;
- склерополикистоз яичников;
- кисты яичников;
- эндометриоз (аденомиоз) миома (фибромиома) матки;
- дисплазия шейки матки.

Противопоказания

Беременность, период кормления грудью, дети до 18 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

2,5 мл (~0,5 чайной ложки) принимать 3-4 раза в день до еды, предварительно развести в 50-100 мл воды.

Побочные реакции

При длительном применении возможны диспепсические явления: тошнота, рвота, реже - потеря аппетита, понос; аллергические реакции в виде лихорадки, лихорадки, бронхоспазма; сонливость, повышенная утомляемость. В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Упаковка

Флакон 100 мл.

Производитель

АО "БИОЛЕК", Украина.