

## **Состав**

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит: желчи сухой экстракт (Bile dry ext.) - 80 mg (мг), экстракт чеснока (*Allium sativum* L. ext.) - 40 mg (мг), угля активированного (Activated carbon) - 25 mg (мг), густой экстракт крапивы двудомной (*Thick Urtica dioica* L. ext.) - 5 mg (мг).

*Вспомогательные вещества:* уплотнитель дикальция фосфат, наполнитель целлюлоза микрокристаллическая, стабилизатор крахмал кукурузный, пленочная оболочка желтая (гидроксипропилметилцеллюлоза, титана диоксид, триэтилцитрат, этилцеллюлоза, хинолин желтого озера (E104), полиэтиленгликоль, тальк), загуститель поливинилпирролидон (PVP K 30), консервант натрия бензоат (E211), антиспикаючи агенты тальк, магния стеарат (E572).

Содержит краситель E104, который может оказывать вредное воздействие на активнись и внимание детей.

## **Характеристика ингредиентов**

### Чеснок огородный (*Allium sativum* L.):

- стимулирует секреторно-моторную функцию желудочно-кишечного тракта;
- активизирует секрецию желчи, предупреждает образование холестериновых конкрементов;
- оказывает гиполипидемическую активность (способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов и повышению количества липопротеинов высокой плотности);
- подавляет процессы брожения в кишечнике, способствует развитию нормальной кишечной флоры;
- предупреждает повреждение печени и желчного пузыря;
- предотвращает рост патогенной флоры, проявляя значительную бактерицидное, противогрибковое, антимикробное действия;
- проявляет иммуномодулирующее действие благодаря высокому содержанию витаминов, микроэлементов и фитонцидов;
- обладает выраженными дезинтокационными и антиоксидантными свойствами.

### Крапива двудомная (*Urtica dioica* L.):

- имеет желчегонный эффект;
- оказывает противовоспалительное действие;

- улучшает регенеративные процессы в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта;
- нормализует в организме липидный обмен.

#### Желчь сухая:

- принимает активное участие в процессах пищеварения (активирует ферментативную активность поджелудочной железы и кишечного сока, а также - моторику желудочно-кишечного тракта);
- принимает участие в процессах липидного обмена, регулируя процессы эмульгации жиров и холестерина;
- обладает бактериостатическим эффектом, предотвращает рост и размножение патогенной флоры;
- способствует усвоению жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К).

#### Уголь активированный:

- адсорбент, имеет большую поверхностную активность и высокой сорбционной способности;
- уменьшает всасывание из пищеварительного тракта токсичных веществ;
- адсорбирует газы в кишечнике, уменьшая метеоризм.

### **Показания**

Холикс может быть рекомендован в качестве источника биологически активных веществ, способствующих нормализации работы желчевыводящих путей и печени, способствуют улучшению пищеварения. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом.

### **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к активным компонентам, детский возраст, беременность и период кормления грудью состояния, сопровождающиеся риском обструкции желчевыводящих путей (наличие конкрементов, спастические и обтурационные явления в желчевыводящих путях), острые воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте и органах пищеварительной зоны и язвенные процессы желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым рекомендуется применять по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки после еды в течение 3-4 недель, а затем по 1 таблетке 2-3 раза в сутки после еды в течение 1-

2 месяцев. При необходимости по назначению врача поддерживающий курс приема повторять 2-3 раза с перерывом в 3 месяца. Обычно первые признаки улучшения состояния появляются на 5-8 сутки после начала применения.

*Срок употребления:* срок употребления и возможность повторных курсов согласовывать с врачом.

### **Срок годности**

3 года от даты производства.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке производителя.

### **Упаковка**

По 10 таблеток в блистере, 5 блистеров в упаковке.

### **Производитель**

Ананта Медикаер Лимитед.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Дж-1-265, Фаза - II, РИИКУ Индастриал Эриа, Удиоог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.