

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 г пасты содержит: кислоты борной – 0,07 г; натрия тетрабората – 0,07 г; кислоты салициловой – 0,014 г; цинка оксида – 0,25 г; гексаметилентетрамина – 0,035 г; раствора формальдегида – 0,035 г; свинца ацетата – 0,003 г; масла мяты перечного – 0,003 г;

*другие составляющие:* вода очищенная, эмульгатор № 1, тальк, глицерин.

## **Лекарственная форма**

Паста.

*Основные физико-химические свойства:* однородная масса белого цвета или с немного сероватым оттенком, приятного запаха. В процессе хранения возможно выступ жидкости на поверхности препарата.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Дерматологические средства. Код АТХ D11A A.

## **Фармакодинамика**

Свойства лекарственного средства обусловлены входящими в его состав активными компонентами. Кислота борная, натрия тетраборат оказывают антисептическое действие, кислота салициловая – противомикробное, противовоспалительное и кератопластическое действие; цинка оксид и свинца ацетат – адсорбирующее, противомикробное, вяжущее действие; гексаметилентетрамин и формальдегид – дезинфицирующее, противомикробное, антимикотическое и дезодорирующее действие; ментол (входящий в состав масла мяты перечной) – охлаждающее, сосудорасширяющее действие.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Микозы стоп, гипергидроз, опрелости, повышенная потливость.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, хронические заболевания почек, острые воспалительные заболевания кожи и прилегающих тканей, повреждение кожных покровов в месте нанесения, спазмофилия, бронхиальная астма.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Поскольку в состав препарата входит салициловая кислота, то Пасту Теймурова не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными ретиноидами.

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадание в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов – производных сульфонилмочевины.

*При необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.*

### **Особенности применения**

Пасту Теймурова не следует наносить на большие участки тела, открытые раны, волосистую часть головы, при воспалительных заболеваниях кожи. Не допускать попадания препарата в глаза и слизистые. В случае попадания пасты в глаза следует удалить пасту марлевым тампоном и тщательно промыть глаза теплой водой.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Лекарственное средство противопоказано в период беременности или кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Лекарственное средство предназначено для наружного применения. Пораженные участки кожи взрослым и детям в возрасте от 14 лет обрабатывать 2-3 раза в сутки, нанося пасту тонким слоем. Не рекомендуется наносить препарат на большие участки кожи. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от достигнутого эффекта и течения заболевания.

## **Дети**

Не применять детям до 14 лет.

## **Передозировка**

При длительном применении препарата на больших поверхностях возможны проявления передозировки: головная боль, тошнота, рвота, спутанность сознания, диарея, кожная сыпь. В этих случаях следует прекратить применение препарата, назначить дезинтоксикационную и симптоматическую терапию.

## **Побочные реакции**

Возможны головные боли, тошнота, в тяжелых случаях – рвота, спутанность сознания, головокружение, шум в ушах, боль в эпигастрии, ацидоз, ускоренное дыхание, диарея, олигурия; при нанесении на большие участки кожи возможно развитие почечной недостаточности. Местные реакции: раздражение, боль, жжение, сухость кожи. Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, крапивницу, шелушение кожи, контактный дерматит, анафилактические реакции, в том числе шок, ангионевротический отек.

*В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обязательно обратиться к врачу.*

## **Срок годности**

1 год 6 месяцев.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2°C до 8°C.

*Хранить в недоступном для детей месте.*

**Упаковка**

Паста по 25 г в тубе без пачки.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО "Тернофарм".

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).