

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 г мази содержит кислоты ундециленовой 0,05 г, цинка ундецилената 0,2 г;

*вспомогательные вещества:* кислота стеариновая, воск белый, парафин, масло минеральное, метилпарабен (Е 218), этоксилированные природные спирты С16-С18, моноглицериды дистиллированные, парафин белый мягкий, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* от почти белого до желтоватого цвета мазь с характерным запахом и мелкими гранулами жира.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противогрибковые средства для местного применения. Код АТС D01A E04.

## **Фармакодинамика**

Ундециленовой кислота и ее соли оказывают фунгистатическое, а в больших концентрациях - фунгицидное действие в отношении дерматофитов *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporon audouini*. Препарату также присуща определенная степень бактериостатического действия в отношении штаммов *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus rettgeri*, *Aeromonas hydrophila*, *Yersinia enterocolitica*.

Цинк, который является составной цинка ундецилената, стягивает кожу, уменьшая ее раздражение и ускоряя заживление.

## **Показания**

Поверхностные микозы кожи, вызванные микроорганизмами, чувствительными к действующим веществам препарата, в частности дерматомикоз гладкой кожи, паховой дерматомикоз, дерматомикоз стоп, межпальцевые дерматомикоз, в том числе смешанные кандидозные и бактериальные инфекции.

С профилактической целью препарат назначать при чрезмерном потоотделении, при проявлениях раздражения в местах влажной опрелости (паховые области,

под молочными железами), потницы.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующим веществам и к любым другим компонентам препарата, в частности к ундециленату и парабенам. Возраст до 2 лет. Мазь нельзя наносить на мокнущие участки кожи, язвы и волдыри, следует избегать попадания в глаза и на участки вокруг глаз.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Особенности применения**

Следует избегать попадания в глаза и на участки вокруг глаз.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Микосептин не имеет побочного влияния на внимание и сосредоточенность.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Экспериментальные исследования не проводились. Также проводили исследования при участии беременных женщин или кормящих грудью. С другой стороны, у матерей или детей не наблюдалось никаких побочных эффектов после местного применения ундецилената.

## **Способ применения и дозы**

Для лечения взрослых и детей от 2 лет мазь наносить на вымытую сухую кожу дважды в день в течение не менее одной недели. После исчезновения клинических признаков лечение продолжать, применяя мазь 1 раз в день в течение еще 1 недели, а затем - через день или два раза в неделю. В общем лечении длится 1 месяц. Сокращение курса лечения может привести к появлению рецидива.

## **Дети**

Микосептин® применять детям в возрасте от 2 лет.

## **Передозировка**

В случае случайного приема внутрь в детей возможны появление тошноты и рвоты. Рекомендуется искусственно вызвать рвоту.

## **Побочные реакции**

Обычно препарат переносится хорошо.

В течение курса лечения может развиваться реакция повышенной чувствительности к некоторым компонентам препарата. К признакам такой повышенной чувствительности принадлежат зуд, покраснение (гиперемия), припухлость кожи (отеки), ощущение жжения, кожная сыпь. Иногда - возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей, незначительное раздражение кожи, экзема (исчезает самостоятельно после отмены препарата).

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° C.

## **Упаковка**

По 30 г мази в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ООО «Зентива» / Zentiva k.s.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

В кабеловны 130, 102 37 Прага 10, Долни Мехолупы, Чехия / U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 Dolni Mecholupi, Czech Republic.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).