

## **Состав**

*действующее вещество:* натамицин;

1 г крема содержит 20 мг натамицина;

*вспомогательные вещества:* децил олеат, воска цетилового эфир, спирт цетостеариловый, натрия лаурилсульфат, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), пропиленгликоль, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Крем.

*Основные физико-химические свойства:* крем от белого до желтоватого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противогрибковые препараты для местного применения. Антибиотики. Код АТХ D01A A02.

## **Фармакодинамика**

Натамицин является полиеновым противогрибковым антибиотиком. Его противогрибковые свойства связаны с нарушением целостности клеточных мембран при взаимодействии на уровне синтеза стеролов. К натамицину чувствительны большинство патогенных грибов. *Candida albicans* чувствительна к натамицину.

## **Фармакокинетика**

Натамицин активен при местном применении и практически не абсорбируется через кожу и мембраны слизистых оболочек.

## **Показания**

Грибковые поражения кожи, вызванные *Candida albicans*.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Особенности применения**

Наличие в составе препарата метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216) может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные). Спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Крем наносить на пораженные участки кожи 1-4 раза в сутки ежедневно. Длительность терапии обычно составляет 2-3 недели.

## **Дети**

Натамицин в лекарственной форме крем применять детям всех возрастов.

## **Передозировка**

Нет данных.

## **Побочные реакции**

<b>Система организма</b>	<b>Редко(<math>\geq 1/10\ 000</math> - <math>&lt; 1/1000</math>)</b>
<i>Общие нарушения и изменения в месте применения</i>	Реакции гиперчувствительности, жжение, раздражение.

*Реакции гиперчувствительности:* в месте применения, жжение и раздражение могут возникать.

Если они продолжаются, это может быть следствием гиперчувствительности к консервантам (парагидроксибензоаты).

#### Сообщения о побочных реакциях

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важны. Таким образом, можно постоянно оценивать соотношение пользы / риска для лекарственного средства.

Врачей просят сообщать обо всех подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.

#### **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° C. Не хранить в холодильнике или морозильнике. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 30 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Теммлер Италия С.р.л.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Виа делле Индастри, 2, 20061, Каругате (MI), Италия.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).