

Состав

действующие вещества: 1 г крема содержит цинка оксид 15,25%, бензиловый спирт 0,39%, бензилбензоат 1,01%, бензил цинамат 0,15%.

вспомогательные вещества: ланолин, вода очищенная, натрия бензоат (Е 211), воск парафиновый, воск пчелиный синтетический, воск микрокристаллический, сорбитансесквиолеат, пропиленгликоль, линалилацетат, ароматизатор лаванды, масло минеральное, антиоксидант, содержит пропиленгликоль, лимонная кислота, бутилгидроксианизол (Е 320).

Лекарственная форма

Крем для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: белый, гомогенный крем, без видимых примесей, с запахом лаванды.

Фармакотерапевтическая группа

Дermatологические средства. Препараты из смягчающим и защитным действием. Препараты цинка. Код ATX D02A B.

Фармакодинамика

Цинка оксид оказывает антисептическое, вяжущее, противовоспалительное действие. При нанесении на кожу снимает раздражение и заживляет незначительные ожоги, неглубокие раны.

Бензиловый спирт оказывает местное анестезирующее действие с дезинфицирующими свойствами.

Бензилбензоат обладает антисептическим действием, также действует как растворимое вещество.

Бензил цинамат является синтезированной веществом с бензилового спирта и коричной кислоты, которая обладает антибактериальным и противогрибковым действием.

Показания

Для местного лечения:

- пеленочного дерматита;
- опрелостей;
- незначительных термических ожогов;
- отморожения I степени;
- акне;
- пролежней;
- экземы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острые гнойно-воспалительные заболевания кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Только для наружного применения. Не допускать контакта с глазами и слизистыми оболочками. При попадании в глаза и на слизистые оболочки их необходимо промыть водой.

Нельзя курить или находиться у открытого огня из-за опасности сильных ожогов. Ткань (одежда, постельное белье, повязка и т.д.), которая контактировала с этим лекарственным средством, легче горит и представляет серьезную опасность из-за риска возгорания. Стирка одежды и постельного белья может уменьшить накопление препарата, но не может удалить его полностью.

Натрия бензоат может вызвать местное раздражение и усилить желтуху (пожелтение кожи и глаз) у новорожденных (в возрасте до 4 недель).

Если состояние после применения крема не улучшается или даже ухудшается, следует посоветоваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не установлена.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказания отсутствуют. Можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения.

Если не назначено другое, применять взрослым и детям чаще 6 раз в сутки. Препарат следует наносить тонким слоем на пораженные участки кожи.

Продолжительность лечения зависит от тяжести течения заболевания и определяется индивидуально врачом.

Если состояние после применения препарата не улучшается, или даже ухудшается, следует обратиться к врачу.

Дети

Препарат можно применять в педиатрической практике.

Передозировка

При местном применении передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь в больших дозах могут возникать рвота, диарея, стимуляция центральной нервной системы и судороги.

Побочные реакции

Редко могут возникать реакции гиперчувствительности, включая зуд, гиперемия, сыпь, изменения в месте нанесения крема; вспомогательные вещества, входящие в состав лекарственного средства могут вызвать раздражение кожи и местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 125 г в полипропиленовой баночке с контролем первого вскрытия.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Тосар Фарма Лимитед.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Юнит 146 Белдойл Инд. Истейт, Белдойл, Дублин 13, Ирландия

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины.](#)