

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 г крема содержит цинка оксид 15,25%, бензиловый спирт 0,39%, бензилбензоат 1,01%, бензил цинамат 0,15%.

*вспомогательные вещества:* ланолин, вода очищенная, натрия бензоат (Е 211), воск парафиновый, воск пчелиный синтетический, воск микрокристаллический, сорбитансесквиолеат, пропиленгликоль, линалинацетат, ароматизатор лаванды, масло минеральное, антиоксидант, содержит пропиленгликоль, лимонная кислота, бутилгидроксианизол (Е 320).

## **Лекарственная форма**

Крем для наружного применения.

*Основные физико-химические свойства:* белый, гомогенный крем, без видимых примесей, с запахом лаванды.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Дерматологические средства. Препараты из смягчающим и защитным действием. Препараты цинка. Код АТХ D02A B.

## **Фармакодинамика**

Цинка оксид оказывает антисептическое, вяжущее, противовоспалительное действие. При нанесении на кожу снимает раздражение и заживляет незначительные ожоги, неглубокие раны.

Бензиловый спирт оказывает местное анестезирующее действие с дезинфицирующими свойствами.

Бензилбензоат обладает антисептическим действием, также действует как растворимое вещество.

Бензил цинамат является синтезированной веществеом с бензилового спирта и коричной кислоты, которая обладает антибактериальным и противогрибковым действием.

## **Показания**

Для местного лечения:

- пеленочного дерматита;
- опрелостей;
- незначительных термических ожогов;
- отморожения I степени;
- акне;
- пролежней;
- экземы.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острые гнойно-воспалительные заболевания кожи.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

### **Особенности применения**

Только для наружного применения. Не допускать контакта с глазами и слизистыми оболочками. При попадании в глаза и на слизистые оболочки их необходимо промыть водой.

Нельзя курить или находиться у открытого огня из-за опасности сильных ожогов. Ткань (одежда, постельное белье, повязка и т.д.), которая контактировала с этим лекарственным средством, легче горит и представляет серьезную опасность из-за риска возгорания. Стирка одежды и постельного белья может уменьшить накопление препарата, но не может удалить его полностью.

Натрия бензоат может вызвать местное раздражение и усилить желтуху (пожелтение кожи и глаз) у новорожденных (в возрасте до 4 недель).

Если состояние после применения крема не улучшается или даже ухудшается, следует посоветоваться с врачом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не установлена.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказания отсутствуют. Можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Только для наружного применения.

Если не назначено другое, применять взрослым и детям чаще 6 раз в сутки. Препарат следует наносить тонким слоем на пораженные участки кожи.

Продолжительность лечения зависит от тяжести течения заболевания и определяется индивидуально врачом.

Если состояние после применения препарата не улучшается, или даже ухудшается, следует обратиться к врачу.

### **Дети**

Препарат можно применять в педиатрической практике.

### **Передозировка**

При местном применении передозировка маловероятна. При случайном приеме внутрь в больших дозах могут возникать рвота, диарея, стимуляция центральной нервной системы и судороги.

### **Побочные реакции**

Редко могут возникать реакции гиперчувствительности, включая зуд, гиперемия, сыпь, изменения в месте нанесения крема; вспомогательные вещества, входящие в состав лекарственного средства могут вызвать раздражение кожи и местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 250 г в полипропиленовой баночке с контролем первого вскрытия.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Тосар Фарма Лимитед.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Юнит 146 Белдойл Инд. Истейт, Белдойл, Дублин 13, Ирландия

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).