Состав

действующее вещество: бензоила пероксид;

1 мл лосьона содержит 0,1 г бензоила пероксида;

вспомогательные вещества: натрия эдетат, карбомер 940, Брий 30 диизопропаноламин, вода очищенная.

Лекарственная форма

Лосьон.

Основные физико-химические свойства: белый кремообразный лосьон без комочков или крупинок с характерным слабым запахом бензоила пероксида.

Фармакотерапевтическая группа

Местные средства для лечения акне.

Код АТХ D10A E01.

Фармакодинамика

Бензоила пероксид обладает антисептическими и кератолитическое свойства, тормозит (в результате высвобождения кислорода) развитие анаэробных микроорганизмов Propionibacterium в угрях, способствует очищению пор.

Фармакокинетика

Препарат проникает в кожу, где превращается в бензойную кислоту.

Показания

Местное лечение и профилактика угревой сыпи (Acne vulgaris) у взрослых и детей старше 12 лет.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бензоила пероксида и другим компонентам препарата.

Возраст до 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение Угресола с другими препаратами для лечения угрей, содержащие резорцин, салициловую кислоту, серу, третиноин, алкоголь, а также с кремами и лосьонами для и после бритья, медицинской косметикой, абразивными и медицинскими мылами, очистителями для лица может повлечь совокупное раздражение и повышение сухости кожи.

Особенности применения

Препарат предназначен только для накожного применения.

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Возможно обесцвечивания волос, бровей и окрашенных тканей.

Для предотвращения аллергической реакции рекомендуется нанести Угресол на небольшой участок кожи на запястье и наблюдать 48 часов: при появлении отека или зуда с выраженной гиперемией применения отменить. В первые недели лечения возможно появление незначительного шелушения и покраснения кожи, исчезает со временем.

Препарат не следует применять лицам пожилого возраста.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат может системно всасываться. Неизвестно, попадает бензоила пероксид в грудное молоко. Исследования по этому поводу не проводились.

Способ применения и дозы

Перед применением флакон встряхнуть несколько раз.

Препарат нанести тонким слоем на вымытую и высушенную кожу, пораженную угрями, осторожно втереть кончиками пальцев до полного впитывания. Применение начинать с 1 раза в день, затем постепенно повышать до 2 - 3 раз в день. В случае чрезмерной сухости или шелушения необходимо сократить применение до 1 раза в день или через день. Оптимальный терапевтический

эффект обычно развивается в течение 8 - 12 недель от начала применения. С целью профилактики можно продолжать лечение 1 раз в день до получения устойчивой ремиссии. Курс применения не должен превышать трех месяцев.

В тяжелых случаях Угресол комбинируют с другими средствами для лечения акне.

Дети

Противопоказано детям до 12 лет.

Передозировка

Симптомы: чрезмерная гиперемия, сухость, жжение, зуд, шелушение или отек кожи.

Лечение рекомендуется протереть кожу марлевым или ватным тампоном, смоченным растительным маслом. Симптомы требуют медицинского вмешательства только тогда, когда они не проходят длительное время и вызывают беспокойство. Иногда возникает необходимость применять кремы или мази, содержащие глюкокортикостероиды.

Побочные реакции

В отдельных случаях через несколько дней после начала лечения препарат может вызвать раздражение, что сопровождается покраснением, шелушением или сухостью кожи, ощущением тепла, покалывания, жжения и зуда.

Очень редко кожные высыпания, аллергический контактный дерматит (жжение, образование пузырей и корок, зуд, покраснение или отек).

Небольшое раздражение можно снять, сократив частоту применения препарата (1 раз в день или через день). При сильном раздражении следует прекратить применение лосьона.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 30 мл во флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармасайнс Инк.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек H4P 2T4, Канада.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.