Опис

Дитяча суміш Nestogen® 4 спеціально розроблена для забезпечення збалансованого здорового харчування та комфортного травлення малюка

Дитяча суміш Nestogen® 4 містить лактобактерії L. Reuteri, які є представниками нормальної кишкової мікробіоти людини. Вони сприяють формуванню правильної мікрофлори шлунково-кишкового тракту, сприяють налагодженню комфортного травлення: у малюка знижується ризик розвитку розладів шлунково-кишкового тракту

Дитяча суміш Nestogen® 4 - це збалансований продукт, що замінює коров’яче молоко в раціоні дитини старше 18 місяців. Дитяча суміш Nestogen® 4 доповнює раціон дитини поживними речовинами, необхідними для її оптимального росту й розвитку

Спосіб застосування

1. Вимийте руки перед тим, як готувати дитині молочну суміш
2. Ретельно вимийте поїльник та кришечку, щоб не лишилося залишків молока. Повністю занурте поїльник та кришку у воду та прокип’ятіть їх впродовж 5 хвилин. Залишайте накритими до використання
3. Прокип’ятіть питну воду і дайте їй охолонути до 37 ˚С.*
4. Чітко дотримуючись таблиці годування, додайте точну кількість води, а потім мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини. Використовуйте мірну ложечку, що знаходиться в пакуванні, заповнену без гірки
5. Переконайтеся, що ложка суха, і сховайте її в упаковку. Після приготування суміші упаковку з порошком слід щільно закрити і зберігати в сухому прохолодному місці
6. Розмішайте суміш до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру
7. Орієнтуючись на таблицю годування, додайте точну кількість мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини
8. Закрийте поїльник кришкою та збовтайте до повного розчинення порошку
9. Після приготування суміші упаковку з порошком слід щільно закривати і зберігати в сухому місці подалі від сонячних променів

** Для збереження кількості живих бактерій у готовій суміші, прокип'ячену воду слід остудити до температури тіла (37˚С), після чого додати суху суміш*

Застереження

Попередження: суміш слід готувати безпосередньо перед кожним годуванням. Точно дотримуйтесь інструкції. Готова суміш, що залишилася після годування, не повинна зберігатися і використовуватися в подальшому

Попередження: використання некип'яченої води і непрокип’ячених пляшечок, неправильне зберігання, транспортування, приготування і годування можуть несприятливо вплинути на здоров'я дитини. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ідеальною їжею для грудної дитини є молоко матері. Продовжуйте грудне вигодовування якнайдовше. Суміш Nestogen® 4 призначена для годування дітей з 18 місяців і не є замінником грудного молока

Умови зберігання

До і після відкриття продукт зберігати за температури не вище 25 °C і відносній вологості повітря не більше 75%. Вжити вміст пакета протягом 3-х тижнів після відкриття. Не рекомендується зберігати в холодильнику

Дата виробництва (MAN), краще спожити до (EXP) та номер партії виробництва вказані на дні упаковки

Склад

Молоко знежирене (62,8%), мальтодекстрин, рослинні олії (соняшникова з високим умістом олеїнової кислоти, ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, соняшникова), сироватка молочна суха, лактоза, молоко сухе знежирене (5%), кальцію цитрат, емульгатор (лецитин соєвий), натрію цитрат, калію цитрат, вітаміни (C, рибофлавін (B2), A, D, B12), калію фосфат, заліза сульфат, культура L. Reuteri1 (не менше $8,9\times10^5$ КУО/г (CFU/g)), цинку сульфат, калію йодид

Запаковано в захисному середовищі

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г/g порошку	на 100 мл/ml готової суміші

Енергетична цінність	кДж (kJ)/ккал (kcal)	2028/485	272/65
Жири	г/g	21.5	2.9
з них насичені	г/g	1.9	0.26
Лінолева кислота (Омега-6)	г/g	3.4	0.46
α- Ліноленова кислота (Омега-3)	мг/mg	270	36
Вуглеводи	г/g	63.4	8.5
з них:			
цукри	г/g	40.9	5.5
лактоза	г/g	38.6	5.2
Білки (казеїн/білки молочної сироватки: 80/20)	г/g	9.4	1.26
Натрій	мг/mg	183	24.5
Калій	мг/mg	540	72.4
Кальцій	мг/mg	600	80.4 (20.1 % РВС)
Фосфор	мг/mg	291	39
Вітамін А	мкг екв ретинолу	433	58 (14.5 % РВС)
Вітамін D	мкг/µg	7.6	1.02 (10.2 % РВС)
Вітамін С	мг/mg	110	14.7 (58.8 % РВС)
Рибофлавін (Вітамін В2)	мг/mg	1.8	0.24 (30 % РВС)
Вітамін В12	мкг/µg	2.9	0.39 (55.7 % РВС)
Залізо	мг/mg	8.66	1.16 (19.3 % РВС)
Йод	мкг/µg	135	18.1 (25.86 % РВС)
Цинк	мг/mg	5.4	0.72 (18 % РВС)
Лактобактерії L. reuteri1	КУО/г	не менше 8.9×10^5	

РВС – референсні величини споживання