

## **Опис**

Lorde Hyal - стерильний розчин для інгаляційного і інтраназального введення, який полегшує дихання шляхом розрідження і поліпшення виведення секрету слизової оболонки носа верхніх і нижніх дихальних шляхів у пацієнтів з запальними захворюваннями органів дихання за рахунок осматического ефекту.

*Гіпертонічний розчин натрію хлориду(3%)* - натуральний і безпечний інгаляційний муколітик. Також містить гіалуронову кислоту - для додаткового пом'якшення і зволоження слизової, а також зменшення подразнюючої дії гіпертонічного розчину солі при інгаляції.

Lorde Hyal в першу чергу показаний хворим з кашлем при:

- ларингіті;
- трахеїтах;
- муковісцидозі;
- бронхітах;
- бронхіолітах;
- бронхоектатичної хвороби;
- хронічної обструктивної хвороби легень.

Lorde Hyal також застосовується при гострих і хронічних захворюваннях носоглотки, носової порожнини і пазух, гіпертрофії аденоїдів у дітей, цілорічного та сезонного алергічного риніту для зменшення набряку слизової, розрідження секрету і полегшення дихання.

Без рецепта! Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією і проконсультуйтеся з медичним фахівцем.

## **Склад**

1 мл розчину містить:

- натрію хлорид - 30 мг;
- натрію гіалуронат - 1 мг.

## **Протипоказання**

Lorde Hyal протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів розчину.

## **Спосіб застосування**

## *Використання за допомогою інгалятора.*

Інгаляцію розчином можна проводити за допомогою небулайзера з використанням спеціальної маски на обличчя, загубника, загубника-соски або назальної канюлі.

При використанні дітям: застосовують дітям від народження. Використовують від 1 до 4 мл розчину. Доза, тривалість і частота використання визначається лікарем.

При використанні для дорослих: використовувати по одному контейнеру 2 рази в день. При необхідності частота використання може бути збільшена до 4 разів на день.

Підготуйте до використання небулайзер:

- відкрийте полімерний пакет і дістаньте одноразовий контейнер. Переконайтеся в тому, що контейнер не пошкоджений. Не діставайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає необхідності.
- Струсіть контейнер, який дістали. інші контейнери залиште в полімерному пакеті і помістіть їх у картонну коробку.
- Утримуючи контейнер за верхній край, поверніть нижню сторону що б відкрити контейнер.
- Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легко натисніть. Переконайтеся в тому, що розчин перетік в небулайзер.
- Зберіть небулайзер і користуйтеся за призначенням. Після використання помийте небулайзер, залишки розчину викидайте, згідно з місцевими вимогами по утилізації відходів.

## *Інтраназальне ведення.*

Дітям до року - по 1-2 краплі в кожную ніздрю 2-3 рази на добу.

Дорослим і дітям від року - по 1 - 3 краплі в кожную ніздрю 3-4 рази на добу.

*Дорослі.* Перед початком процедури слід вимити руки з милом і акуратно звільнити носові проходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для запобігання витікання розчину, потрібно лягти або сісти і закинути голову назад, потім закапати розчин. Після закапування бажано полежати, закинувши назад голову протягом 2 хвилин.

*Діти.* Перед початком процедури слід вимити руки з милом і акуратно звільнити носові проходи дитини від слизу. Закапати розчин в кожний носовий прохід. При закапуванні в праву ніздрю голова дитини повинна бути закинута назад і

нахилена вліво і, навпаки, голова дитини повинна бути нахилена вправо при замовлянні лівої ніздрі. Після закапування слід посадити дитину і допомогти звільнити носові проходи від розрідженого слизу.

### **Побічні ефекти**

У пацієнтів з індивідуальною непереносимістю компонентів розчину можуть виникати алергічні реакції.

В окремих випадках, може виникати гіперемія слизової оболонки носа, кашель або бронхоспазм.

### **Застереження**

Суміш призначена для використання тільки шляхом інгаляційного або інтраназального введення.

Перше використання повинно відбуватися під контролем лікаря або кваліфікованого персоналу. Використання дітьми повинно відбуватися під наглядом дорослих.

У разі виникнення бронхоспазму, кашлю або при появі будь-яких інших побічних ефектів, слід припинити використання пристрою і повідомити лікаря.

Не використовуйте засіб, якщо контейнер був пошкоджений.

Не використовуйте засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Призначений для одноразового використання.

Не змішувати з іншими розчинами або лікарськими засобами.

### **Термін придатності**

2 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від 5 ° C до 25 ° C.