

## Склад

1 таблетка містить: активний інгредієнт: калію йодиду 125 mg (мг); допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кальцію гідрофосфат дигідрат, магнію стеарат, стеаринова кислота, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію тіосульфат.

## Показання до використання

Може бути рекомендована до раціону харчування **виключно** в разі загрози накопичування радіоактивного йоду у щитоподібній залозі для забезпечення її захисту від впливу радіації.

Перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

## Показання до використання

Може бути рекомендована до раціону харчування **виключно** в разі загрози накопичування радіоактивного йоду у щитоподібній залозі для забезпечення її захисту від впливу радіації.

Перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

## Спосіб застосування та дози

Може бути рекомендоване **однократне вживання після оповіщення про радіаційну аварію** та при загрозі надходження в організм радіоактивного йоду для захисту від опромінення щитовидної залози. Дорослим та дітям віком від 12-ти років рекомендовано вжити 1 таблетку, а дітям віком від 3-х до 12-ти років – ½ подрібненої таблетки після прийому їжі, запиваючи невеликою кількістю питної води або молока.

**Термін вживання:** рекомендовано одноразовий прийом; доцільність повторного вживання має визначити лікар індивідуально.

**Не є лікарським засобом.**

## Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, дитячий вік до 3-х років, вагітність та період лактації, гіпертиреоз, гіперфункція щитоподібної залози, токсична аденома, вузликовий або дифузний токсичний зоб, герпетиформний дерматит.

## **Застереження**

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання; не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Прийом під час вагітності і лактації можливий тільки після консультації та за призначенням лікаря. Бажаний період для застосування дієтичної добавки становить 24 години до та 6 годин після передбачуваного впливу радіаційного опромінення. Не рекомендоване повторне застосування дієтичної добавки особам віком від 40 років та старше, крім індивідуальних випадків за рекомендації лікаря. У разі виникнення проявів індивідуальної чутливості до компонентів дієтичної добавки необхідно проконсультуватися із лікарем.

## **Форма випуску**

Таблетки масою 400 mg (mg)  $\pm$  5 %.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Номер партії (серії):** вказано на упаковці.

**Дата «Краще спожити до кінця»:** вказується на упаковці місяць та рік, після якого дієтична добавка не використовується.

## **Виробник**

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

Без ГМО.