

Состав

действующее вещество: предникарбат 1 г крема содержит 2,5 мг предникарбат;

вспомогательные вещества: крем

стеариловый спирт, цетиловый спирт, миристиловый спирт, масло минеральное легкое, полисорбат 60, сорбитанстеарат, кислота этилендиамин-тетрауксусной, октилдодеканол, бензиловый спирт, вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства:

крем - белый непрозрачный, блестящий.

Фармакотерапевтическая группа

Кортикостероиды для применения в дерматологии. Код АТС D07A C18.

Фармакодинамика

Предникарбат - действующее вещество для наружного применения, содержащийся в препарате, представляет собой усовершенствованный сильнодействующий ГКС с четко выраженным противовоспалительным, антиаллергическим, противоэкссудативным, антипролиферативным действием и противозудным действием.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция незначительна.

Показания

Воспалительные заболевания кожных покровов, требующие применения местных кортикостероидов.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к предникарбату или к любому другому компоненту препарата;
- Наличие реакции кожных покровов на прививки;
- Бактериальные кожные симптомы (например, туберкулез, сифилис), а также вирусные кожные симптомы (например, ветряная оспа или инфекционные проявления простого герпеса);
- Периоральный дерматит, розацеа или розовые угри.

Особые меры безопасности

Не наносить препарат на участки вокруг глаз. Если не нанесли препарат предыдущий раз, не следует удваивать дозу. Продолжайте лечение, как предписано врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано.

Особенности применения

- *При нанесении на участки вокруг глаз:* регулярное попадание ГКС в конъюнктивальный мешок может привести к развитию глаукомы и катаракты;
- *при бактериальных и грибковых кожных инфекциях:* местное лечение бактериальных и грибковых кожных инфекций Преднитоп возможно только вместе с препаратами антибактериального или противогрибкового действия. Следует учитывать возможную повышенную чувствительность к цетиловому и стеариловому спирту.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не описано.

Применение в период беременности или кормления грудью

При беременности возможно применение только тогда, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Не наносить препарат на большие участки кожи. Действующее вещество - предникарбат - проникает в материнское молоко, поэтому на период лечения следует воздерживаться от кормления грудью.

Способ применения и дозы

Преднитоп, крем - лечение острых заболеваний кожных покровов (например, покраснение, язвы).

Препарат наносят один раз в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи. При необходимости частоту нанесения препарата можно увеличить до 2-х раз в сутки.

Курс лечения определяет врач, обычно составляет до 2 недель.

Указание: туба имеет оригинальный колпачок. Перед первым применением необходимо открыть отверстие в алюминиевой мембране с помощью стержня оригинального колпачка.

Дети

Младенцы.

У новорожденных Преднитоп разрешается применять только тогда, когда польза превышает потенциальный риск. Применение Преднитоп у младенцев может вызвать синдром Кушинга вследствие повышенного метаболизма.

Передозировка

Краткосрочное применение повышенных доз препарата (очень большое количество, очень большой участок нанесения или очень частое применение) не оказывает никаких побочных эффектов.

Побочные реакции

В ходе лечения Преднитоп могут иметь место нежелательные побочные действия - телеангиэктазия, покраснение кожи и стрии на коже, розацеоподобный дерматит с истончением кожи или без. Внезапное прекращение терапии может привести к ухудшению заживления ран. Через иммунопригнечуючу действие глюкокортикоидов может иметь место скрытый или усиленное развитие существующих кожных инфекций, обесцвечивание, гипертрихоз.

При длительном применении препарата или нанесении его на обширные участки кожи, особенно при наложении герметических повязок, в результате попадания действующего вещества в организм, возможно нарушение гормонального баланса или медикаментозный синдром Кушинга.

Срок годности

3 года.

После открытия тубы - 6 месяцев.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

Туба 10 г в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Мибе ГмбХ Арцнаймиттель.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Мюнхенерштрассе 15, 06796 Брена, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).