

Состав

действующее вещество: ихтиол;

1 г мази содержит 0,1 г ихтиола;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь темно-бурого цвета с запахом ихтиола.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства мази ихтиоловой обусловлены действием биологически активных веществ ихтиола. Мазь ихтиоловая проявляет антимикробное (бактерицидное и бактериостатическое), противовоспалительное и местнообезболивающее действие.

Фармакокинетика

При наружном применении ихтиол практически не абсорбируется в системный кровоток и не проявляет резорбтивного действия.

Показания

Ожоги, экзема, рожистое воспаление, невралгия, артриты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Несовместим с растворами йодистых солей, алкалоидов, солей тяжелых металлов.

Особенности применения

Избегать попадания мази на слизистые оболочки. Руки после нанесения мази следует тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не описан.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническая эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучалась.

Способ применения и дозы

Мазь применять наружно. Препарат наносить на пораженный участок 2-3 раза в сутки открытым или закрытым (под повязкой) способом. Продолжительность применения обусловлена течением заболевания и эффективностью терапии.

Дети

Опыт применения у детей не описан.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Побочные реакции

Возможны местные или генерализованные аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд, жжение, покраснение кожи, чаще в начале лечения или при длительном применении.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубах без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).