

Состав

действующие вещества: формальдегид, этанол;

50 мл раствора содержат раствора формальдегида в пересчете на 35% содержание формальдегида - 10,0 г, этанола 96% - 39,5 г;

вспомогательные вещества: одеколон, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость с ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические препараты. Средства, применяемые при гипергидрозе. Код ATX D11A A.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает дезинфицирующее и дезодорирующее действие.

Показания

Формидрон применяют для обработки кожи при повышенной потливости.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания кожи. Возраст до 14 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано.

Особенности применения

Резкое покраснение и зуд кожи после нанесения препарата свидетельствуют об индивидуальной повышенной чувствительности к последнему и требуют

немедленного прекращения применения препарата.

С осторожностью назначают больным пожилого возраста и в период беременности. Не наносить на лицо с целью предотвращения раздражения. Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Применяют наружно. Взрослым и детям старше 14 лет протирают кожу ватным тампоном, смоченным препаратом, 1-2 раза в сутки.

Дети

Не применяется у детей до 14 лет.

Передозировка

Не следует допускать передозировки препарата. При длительном и частом применении в случае покраснения, зуда, раздражения, являются признаками передозировки, необходимо прекратить лечение препаратом. Препарат смыть водой с кожных покровов. Терапия - симптоматическая.

Побочные реакции

Раздражение кожи, аллергические реакции, зуд.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

4 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе в пачке или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).