

## **Состав**

*Действующее вещество:* йод (100 мл раствора содержат йода 5 г).

*Вспомогательные вещества:* калия йодид, этанол 96%, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного, применения, спиртовой.

Жидкость красно-бурого цвета, прозрачная в тонком слое, с характерным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТС D08A G03.

## **Показания**

Применяют наружно как антисептическое, раздражающее средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, для обработки операционного поля, для профилактики инфицирования небольших повреждений целостности кожи, для уменьшения воспалительных процессов при миозитах, невралгиях (оказывает отвлекающее действие).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к йоду. Также препарат противопоказан при диабетических, трофических язвах.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Следует соблюдать осторожность при применении йода на слизистые оболочки, поскольку спирт, содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение. Не допускать попадания препарата в глаза. Следует быть особенно осторожными при применении йода у пациентов со светлыми волосами.

Не следует применять на большие участки кожи за возможного развития ожога.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, содержащих органические соединения, может наблюдаться денатурация белковых компонентов.

Несовместим с эфирными маслами, раствором аммиака, бриллиантовым зеленым. Несовместим с дезинфицирующими лекарственными средствами, содержащими ферменты ртути, щелочи, восстановители.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не рекомендуется применение препарата в период беременности и кормления грудью через риск развития нарушений функции щитовидной железы у плода/ребенка.

## **Способ применения и дозы**

При наружном применении йодом смачивают ватный тампон, который используют для обработки пораженных участков кожи.

## **Дети**

Не применять у новорожденных из-за возможного риска развития нарушений функции щитовидной железы и поражений кожи.

## **Передозировка**

При передозировке возможны явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюнотечение, угревая сыпь на коже), ожоги, раздражения кожи.

Симптоматическая терапия.

## **Побочные реакции**

Возможно появление насморка, крапивницы, отека Квинке, слюно- и слезотечения, сыпи на коже, контактного дерматита.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 20 мл в флаконах.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ОАО "Фитофарм".

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

02152, Украина, г. Киев, пр. Павла Тычины, 1В, ТЦ «Сильвер Бриз», офис А, 5 этаж.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).