

Состав

Действующее вещество: йод (100 мл раствора содержат йода 5 г).

Вспомогательные вещества: калия йодид, этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного, применения, спиртовой.

Жидкость красно-бурого цвета, прозрачная в тонком слое, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код ATC D08A G03.

Показания

Применяют наружно как антисептическое, раздражающее средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, для обработки операционного поля, для профилактики инфицирования небольших повреждений целостности кожи, для уменьшения воспалительных процессов при миозитах, невралгиях (оказывает отвлекающее действие).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду. Также препарат противопоказан при диабетических, трофических язвах.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Следует соблюдать осторожность при применении йода на слизистые оболочки, поскольку спирт, содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение. Не допускать попадания препарата в глаза. Следует быть особенно осторожными при применении йода у пациентов со светлыми волосами.

Не следует применять на большие участки кожи за возможного развития ожога.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не рекомендуется применение препарата в период беременности и кормления грудью через риск развития нарушений функции щитовидной железы у плода/ребенка.

Способ применения и дозы

При наружном применении йодом смачивают ватный тампон, который используют для обработки пораженных участков кожи.

Дети

Не применять у новорожденных из-за возможного риска развития нарушений функции щитовидной железы и поражений кожи.

Передозировка

При передозировке возможны явления йодизма (насморк, крапивница, отек Квинке, слезотечение, слюнотечение, угревая сыпь на коже), ожоги, раздражения кожи.

Симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Возможно появление насморка, крапивницы, отека Квинке, слюно- и слезотечения, сыпи на коже, контактного дерматита.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ОАО "Фитофарм".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

02152, Украина, г. Киев, пр. Павла Тычины, 1В, ТЦ «Сильвер Бриз», офис А, 5 этаж.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины.](#)