

## **Состав**

*действующее вещество:* сухой экстракт листьев плюща;

1 мл сиропа содержит 7 мг сухого экстракта листьев плюща (*Hedera helix L.*) (5-7,5:1) (экстрагент - этанол 30%);

*другие составляющие:* сорбитол, калия сорбат, пектин яблочный, ароматизатор «Вишня», вода очищенная.

## **Свойства**

Препарат растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, оказывающий отхаркивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антимикробное действия, обусловленные присутствующими в нем гликозидами (сапонинами). Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

## **Рекомендации по применению**

- Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем;
- симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия**

Без консультации врача не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например с кодеином или декстрометорфаном.

## **Особенности по применению**

Длительный или рецидивирующий кашель у детей от 2 до 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением.

Если появится одышка, горячка или гнойная мокрота, следует обратиться за консультацией к врачу.

Сопутствующее применение опиатных средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендуется без медицинской консультации.

С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

*Важная информация о вспомогательных веществах.*

Это лекарственное средство содержит соединения калия. Следует быть осторожным при применении пациентам с пониженной функцией почек или соблюдающим низкокалийевую диету.

«Плющая сироп» содержит сорбитол. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Не рекомендуется применять в период беременности или кормления грудью из-за отсутствия достаточных данных.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.* Не было никаких сообщений о влиянии лекарственного средства на способность управлять автомобилем и другими механическими средствами.

## **Способ применения**

- Детям от 2 до 6 лет – по 2,5 мл сиропа\* (½ чайной ложки) 3 раза в сутки.
- Детям от 6 до 10 лет – по 5 мл сиропа\* (1 чайная ложка) 3 раза в сутки.
- Взрослым и детям от 10 лет – по 5–7,5 мл сиропа\* (1–1½ чайной ложки) 3 раза в сутки.

Сироп следует применять утром, днем и вечером. Перед каждым применением нужно тщательно взбалтывать сироп!

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях продолжительность лечения составляет 7 дней. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию еще через 2–3 дня после улучшения состояния пациента.

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу для дальнейшего лечения.

Рекомендуется в период приёма в течение дня пить много воды или теплых напитков без содержания кофеина.

\* Применять мерный стаканчик при его наличии в упаковке.

*Дети.*

Лекарственное средство противопоказано детям до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов. Применение детям 2–4 лет требует рекомендаций врача.

### **Передозировка**

Передозировка может спровоцировать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение. Лечение симптоматическое.

### **Побочные эффекты**

При применении возможны аллергические реакции (преимущественно сыпь и др.), купероз, диспноэ.

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Форма выпуска**

Сироп. По 100 мл или по 200 мл во стеклянном флаконе или полимерном в пачке. Допускается комплектация флакона мерным стаканчиком.

### **Производитель**

**Производитель.** ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.**

Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.