

## **Состав**

*действующее вещество:* ихтиол;

1 г мази содержит ихтиола 100 мг;

*вспомогательное вещество:* парафин белый мягкий.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь темно-бурого цвета с запахом ихтиола. По внешнему виду мазь должна быть однородной.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

## **Фармакодинамика**

Фармакологические свойства мази ихтиоловой обусловлены действием биологически активных веществ ихтиола. Мазь ихтиоловая обладает антимикробным (бактерицидным и бактериостатическим), противовоспалительным и местнообезболивающим действием.

## **Фармакокинетика**

При наружном применении ихтиол практически не абсорбируется в системный кровоток и не проявляет резорбтивного действия.

## **Показания**

Ожоги, экзема, рожистое воспаление, невралгия, артриты.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Несовместим с растворами йодистых солей, алкалоидов, солей тяжелых металлов.

## **Особенности применения**

Избегать попадания мази на слизистые оболочки.

Руки после нанесения мази следует тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не описано.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Кормящим грудью женщинам не допускать попадания мази на соски. Безопасность и эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучались.

## **Способ применения и дозы**

Применяют наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки и прикрывают повязкой. Продолжительность курса лечения обусловлена течением заболевания и эффективностью терапии.

Для лечения рожистого воспаления и осложненных форм ожогов, артритов, невралгии, экземы используется в составе комплексного лечения.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или

наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

## **Дети**

Опыт применения у детей не описан.

## **Передозировка**

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

## **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции, раздражение кожи (жжение, зуд, сыпь, покраснение кожи), особенно в начале лечения и при длительном применении. При появлении сильного раздражения кожи или других необычных реакций применение мази следует прекратить.

## **Срок годности**

5 лет.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 30 г в тубах.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЧАО «ФИТОФАРМ», Украина.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая обл., Г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).