

Состав

действующее вещество: масло вазелиновое;

1 флакон содержит 25 мл масла вазелинового.

Лекарственная форма

Масло.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная маслянистая жидкость, не флуоресцирует в дневном свете.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительные средства. Код АТХ А06А А01.

Фармакодинамика

Вазелин - очищенная смесь твердых и жидких углеводов, которые получают из нефти. При приеме внутрь, не всасываясь, размягчает каловые массы и способствует их продвижению кишечником. При наружном применении устраняет сухость кожи, практически не абсорбируется в системный кровоток.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

- Внутрь - хронические запоры у взрослых.
- Внешне - перед применением банок, при сухости кожи (в том числе вокруг естественных отверстий), перед проведением медицинских процедур (смазывать наконечник клизмы, дымовых трубки).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Нельзя применять внутрь при острых воспалительных процессах органов брюшной полости (аппендицит, перитонит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит), геморрое, в период менструации. Не применять при отравлении фосфором и фосфорорганическими соединениями. Не применять внутрь

одновременно с жирорастворимыми антигельминтными средствами (натамол, вермокс, медамин, авермол).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает побочные эффекты жирорастворимых и антигельминтных средств.

Особенности применения

Перед применением взболтать. При необходимости после аппликации масло вытереть ватным или марлевым тампоном и смыть теплой водой с мылом. После прекращения приема внутрь масло вазелиновое может определенное время выделяться из заднего прохода и загрязнять белье, поэтому рекомендуется использовать прокладки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности препарат противопоказан. В период кормления грудью применять с учетом соотношения польза для матери / риск для ребенка, которое определяет врач.

Способ применения и дозы

Назначать взрослым внутрь по 1-2 столовые ложки в сутки. Длительность применения определяет врач индивидуально в зависимости от терапевтического эффекта и переносимости препарата. Внешне - взрослым и детям смазывать кожу тонким слоем, слегка втирая.

Дети

Применять детям только внешне.

Передозировка

Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

Длительное применение может привести к нарушению процесса пищеварения, тошноту, анорексию, гиповитаминоз А, D, К, раздражение и зуд в области заднего прохода. Возможны аллергические реакции, включая гиперемию, зуд кожи.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО "Фитофарм".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).