

## **Склад**

*діючі речовини:*

1 таблетка містить:

Allium сера 3СН ..... 0,333 мг;

Belladonna 3СН ..... 0,333 мг;

Gelsemium 3СН ..... 0,333 мг;

Kalium bichromicum 3СН ..... 0,333 мг;

Pulsatilla 3СН ..... 0,333 мг;

Sabadilla 3СН ..... 0,333 мг;

*допоміжні речовини:* сахароза, тальк, акація (гуміарарабік), магнію стеарат, желатин, віск білий, віск карнаубський.

## **Лікарська форма**

Таблетки, вкриті оболонкою.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білі, з блискучою поверхнею, двоопуклі, вкриті оболонкою таблетки. Без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний засіб.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.* Фармакологічні властивості препарату зумовлені комплексною дією активних компонентів, спрямованою на зняття симптомів застуди та риніту.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

## **Показання**

У складі комплексного симптоматичного лікування застуди та риніту.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин лікарського засобу.

Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози, глюкозо-галактозною мальабсорбцією або сахаразо - ізомальтазною недостатністю не слід приймати цей засіб.

## **Особливості щодо застосування**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Оскільки безпека застосування Коризалії® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період застосовують тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не виявлено.

## **Спосіб застосування та дози**

Для перорального застосування.

*Дорослі та діти віком від 2 років:* по 1 таблетці 6-8 разів на добу. При покращенні стану частоту прийому зменшити.

Повільно розсмоктувати у роті до повного розчинення.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, але не більше 7 днів.

Якщо симптоми захворювання не зникають чи спостерігається погіршення стану, необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.

*Діти.* Коризалія®, таблетки, вкриті оболонкою, рекомендовані для дітей віком від 2 років. Дітям віком до 6 років перед прийомом таблетку рекомендується подрібнити та розчинити у невеликій кількості води.

## **Передозування**

Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялось.

## **Побічні ефекти**

У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препаратору можливий розвиток алергічних реакцій. В разі появи будь-яких побічних реакцій необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Упаковка**

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

## **Упаковка**

По 20 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

БУАРОН/ BOIRON.