

Состав

действующие вещества: carbo activatus;

1 таблетка содержит: активированный уголь – 0,25 г;

другие составляющие: крахмал картофельный, тальк.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: - таблетки черного цвета круглой формы с плоской поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбенты.

Код АТХ А07В А01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Уголь растительного происхождения, благодаря специальной обработке (активации), имеет большую сорбционную поверхность и способен поглощать газы, алкалоиды, эндо- и экзотоксины и другие химические соединения. Уголь активированный в таблетках обладает несколько меньшей адсорбционной способностью, чем в форме порошка.

Фармакокинетика.

Лекарственное средство не токсично, хорошо выводится из организма через кишечник. Препарат из кишечника не всасывается и полностью выводится с каловыми массами через 8–24 часа.

Показания

- Острые отравления бытового,
- промышленного и пищевого происхождения; острые отравления лекарственными средствами,
- отравления алкалоидами, солями тяжелых металлов;

- диспепсия, метеоризм, пищевые токсикоинфекции.
- Подготовка к рентгенологическим исследованиям.

Противопоказание

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Язвы желудочно-кишечного тракта, желудочные кровотечения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Благодаря адсорбирующим свойствам уголь активированный способен уменьшать эффективность принимаемых одновременно с ним лекарственных средств. Поэтому при сопутствующей фармакотерапии активированный уголь следует принимать за 1-1,5 часа до или после приема лекарственных средств.

Особенности по применению

При сопутствующей фармакотерапии уголь активированный принимать за 1-1,5 ч до или после приема лекарственных средств или пищи в связи с адсорбирующими свойствами лекарственного средства. Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызывать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции. При наличии гиповитаминоза, которым может сопровождаться длительное применение активированного угля, необходимо назначать поливитамины.

Женщинам, принимающим противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения активированным углем использовать другие противозачаточные средства.

Кал после приема окрашивается в черный цвет.

Уголь активированный является обычным лекарственным средством минерального происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденными длительным применением.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Данных о негативном влиянии активированного угля в период беременности или кормления грудью нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозирование

При метеоризме и диспепсии взрослым применять от 1 до 3 таблеток 3-4 раза в день.

При отравлениях и интоксикациях назначать в дозе 20-30 г на прием в виде водной суспензии в 0,5-2 стакана воды. Такая суспензия используется и для промывания желудка.

При повышенной кислотности взрослым назначать 1-2 г лекарственного средства 3-4 раза в день.

Для достижения более быстрого и выраженного эффекта можно измельчить и принимать в виде суспензии (на 0,5 стакана воды).

Дети от 3 лет: обычная доза составляет 2-4 таблетки 3-4 раза в сутки; при диарее дозу увеличить до 4-5 таблеток 3-4 раза в сутки.

При разных отравлениях детям от 3 до 7 лет назначать внутрь в дозе 5 г 3 раза в сутки; детям в возрасте от 7 до 14 лет назначать внутрь в дозе 7 г 3 раза в сутки.

Детям уголь активирован всегда назначать в виде суспензии измельченных таблеток в небольшом количестве воды, после приема которой необходимо выпить стакан воды.

Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3-5 дней, при хронических заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями - 10-15 дней.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются какие-либо побочные реакции.

Дети.

Лекарственное средство не применять детям до 3 лет.

Передозировка

Значительное превышение максимальных разовых доз приводит к побочному действию: тошноты, рвоты и запоров, исчезающих после отмены лекарственного

средства.

Побочные эффекты

Возможны проявления повышенной чувствительности, запоры или поносы, легко устраняемые отменой лекарственного средства и назначением симптоматической терапии. Возможно развитие тошноты и рвоты. При длительном применении может наблюдаться нехватка витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует лекарственной коррекции. При появлении каких-либо нежелательных явлений пациенту необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 10 таблеток в блистерах.

По 10 таблеток в блистере; по 2 или по 10 блистеров в пачке из картона.

Производитель

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Категория отпуска

Без рецепта

Адрес

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.