

## **Состав**

100 г раствора содержат 2-пропанол - 63 г, бензалкония хлорид - 0,025 г

*вспомогательные вещества:* красители: оранжево-желтый S (E 110), хинолин желтый (E 104), бриллиантовый черный BN (E 151), вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор наружный, спиртовой.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A X53.

Средство обладает пролонгированным бактерицидным (в т. ч. по отношению к MRSA / EHEC1) и других антибиотикорезистентных бактерий), фунгицидное, туберкулоцидное действие. Инактивирует вирусы гепатита В и С, ВИЧ, герпеса типа 1, ротавирусы, вакцинированные вирусы и тому подобное. Спиртовая составляющая препарата одновременно с быстрым эффектом антимикробного действия обеспечивает обезжиривание и очистку кожи, а также проникновение бензалкония хлорида в глубокие слои кожи, за счет чего обеспечивается пролонгированное действие препарата. Кутасепт® Г способствует эффективному прилипанию хирургической пленки после высыхания средства.

## **Показания**

Пред- и послеоперационная обработка кожи и операционных швов, антисептическая обработка кожи перед инъекциями, забором крови, пункциями, мелкими хирургическими вмешательствами, при мелких травмах и инфекциях кожи бактериальной и грибковой этиологии. Гигиеническая и хирургическая обработка кожи рук.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не применять для антисептической обработки слизистых оболочек. Не допускать контакта со слизистыми оболочками глаз.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение возможно после консультации с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Кутасепт® Г - готовый раствор для наружного применения. Благодаря интенсивному цвету хорошо маркирует операционное поле. Место манипуляции или пораженный участок необходимо полностью увлажнить препаратом. Антисептическая обработка и очистка кожи перед инъекциями: - кожа с большим количеством сальных желез (400-900 желез / см<sup>2</sup>). Для поверхностей ладоней действуют рекомендации по антисептической обработке кожи рук.

### **Дети**

Нельзя применять препарат для обработки кожи новорожденным и недоношенным детям. В других случаях препарат применяют по назначению врача.

### **Срок годности**

5 лет.

### **Условия хранения**

Легковоспламеняющийся препарат. Следует соблюдать правила техники безопасности при работе со спиртосодержащими средствами. Хранить при температуре не выше 25 ° С в местах, недоступных для детей.

### **Упаковка**

Флакон по 1000 мл.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Боде Хеми ГмбХ.