

## **Склад**

Активні інгредієнти: 1 капсула містить порошкоподібні екстракти: плодів Со Пальмет- то (*Serenoa repens*) 160 мг (mg), насіння гарбуза (*Cucurbita moschata*) 60 мг (mg), бульби африканської картоплі (*Huroxis hemerocallidea*) 50 мг (mg), кореня кропиви дводомної (*Urtica dioica*) 50мг (mg), кори африканської сливи (*Prunus africana*) 40 мг (mg), пилку жита (*Secale cereale*) 25 мг (mg); оболонка капсули: желатин, барвник титану двоокис.

## **Фармакологічні властивості**

В етіології патологічних процесів, що призводять до порушення сечовипускання у чоловіків, бальових відчуттів та порушення статевої функції, суттєву роль відіграє збільшення утворення андрогену дигідротестостерону (ДГТ), що спричиняє ріст тканини передміхурової залози, шляхом зв'язування з цитоплазматичними рецепторами андрогену. ДГТ утворюється із тестостерону шляхом активації ферменту 5-а-редукгази та активації а-адренорецепторів, що збільшують концентрацію іонів кальцію всередині клітини, та призводять до скорочення гладкої мускулатури.

Функціональні властивості дієтичної добавки «Вогер» обумовлені фізіологічною активністю біологічно активних речовин, що входять до її складу: жирних кислот (лауринова, міристинова, олеїнова, пальмітинова, стеаринова, ліноле- ва) і фітостеролів (Р-ситостерол, кампестерол, стигмастерол), курбітину та жирної олії, цинку, гіпоксозиду, аглікону та рооперолу, вітамінів (К, С, В2, В3, каротиноїдів), хлорофілу, дубильних речовин, органічних кислот, флавоноїдів, макро- та мікроелементів (Si, Fe, Ca, Си, K, Mp, B, Ti, Ni), пентациклічних тритерпенів, п-докоза- нолу та тетракозанолу.

Біологічно активні речовини, що входять до складу «Вогер», володіють протизапальними, антиандрогенними та антиестрогенними властивостями. Вони здатні зменшувати рівень глобуліну, що зв'язує статеві гормони. Найважливішими складовими фітотерапії є фітостероли, (}-ситостерол, жирні кислоти та лекгини. Ці речовини пригнічують ароматазу, ліпооксигеназу та фактор росту, що стимулюють проліферацію клітин передміхурової залози. В тому числі пригнічують а-адренорецептори, 5-а-редукгазу, мускаринові холінорецептори, рецептори дигідропіридину або ванілоїдні рецептори та нейтралізують вільні радикали.

Біологічно активні речовини, що входять до складу «Вогер», зменшують патологічні процеси передміхурової залози, які супроводжуються частими

позивами до сечовипускання, особливо в нічний час, слабким або переривчастим сечовипусканням, відчуттям неповністю випорожненого сечового міхура, дискомфортом, в тому числі під час сечовипускання, дискомфортними відчуттями внизу живота або в області промежини, та порушенням статевої функції.

До складу «Вогер» входять всі компоненти, перелічені в розділі «Фітотерапія» Рекомендацій з лікування доброкісної гіперплазії передміхурової залози Європейської Асоціації Урологів 2019 року:

### **Екстракт плодів Со Пальметто (*Serenoa repens*)**

містить 45% жирних кислот (лауринова, міристинова, олеїнова, пальмітинова, стеаринова, лінолева) і фітостероли (Р-ситостерол, кампестерол, стигмастерол).

Со Пальметто покращує показники сечових симптомів, симптоми та показники потоку сечі за шкалою IPSS. Сприяє блокуванню 5-а-редук- тази та пригніченню зв'язування дегідротесто- стерону з рецепторами простати. Антипролі- феративний ефект обумовлений пригніченням активності ферментів 5-а- редуктази та арома- тази.

Екстракт Со Пальметто відноситься до лідерів серед рослинних засобів, що пригнічують розвиток набряку, запалення в простаті та зменшують розміри передміхурової залози. Численні клінічні дослідження екстракту Со Пальметто в Німеччині, Англії, США та інших країнах показали його високу ефективність при хронічному простатиті. Відсутність небажаних дій дозволяє застосовувати екстракт Со Пальметто протягом тривалого часу, не побоюючись шкідливих для організму наслідків. Крім того, екстракт Со Пальметто сприятливо впливає на стан шкіри та волосся, блокуючи 5-а-редукгазу 2 типу, що є ключовою ланкою в розвитку андрогенної алопеції (випадіння волосся) і вугрової висипки.

Екстракт плодів Со Пальметто призводить до зменшення розміру передміхурової залози та поліпшення симптоматики. Сприяє зупинці перетворення тестостерону в дигідротестосте- рон, тобто усуненню провідної причини розвитку доброкісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ).

### **Екстракт насіння гарбуза (*Cucurbita moschata*)**

містить аміносполуку кукурбітин та жирні олії, які мають протизапальні, відновлювальні, антиоксидантні, імуномодулюючі, регенеративні та антипаразитарні властивості.

Вживання продуктів гарбуза супроводжується зменшенням об'єму передміхурової залози, шляхом протизапального та антиандрогенного ефектів,

зниженням активності детрузора, поліпшенням показників міжнародної шкали симптомів передміхурової залози (IPSS), параметрів урофлоуметрії і якості життя (QoL). Насіння гарбуза також є потужним джерелом цинку, який відіграє важливу роль у функціонуванні сечостатевої системи у чоловіків, сприяє підсиленню статевої функції та нормалізації функціонального стану передміхурової залози при простатиті та аденомі.

### **Екстракт бульби африканської картоплі (*Hypoxis hemerocallidea*) сприяє підсиленню дії**

Со Пальметто. Кореневище рослини африканської картоплі (*Hypoxis hemerocallidea*) відоме своїм традиційним використанням при лікуванні ДГПЗ та інших захворювань сечостатевої системи, в тому числі при інфекціях сечового міхура.

Екстракт, отриманий з бульби африканської картоплі, має основну біоактивну сполуку гіпоксозид, аглікон і рооперол та дає найбільш вагомі докази ефективності та безпеки у нормалізації функціонального стану при ДГПЗ.

**Екстракт кореня кропиви дводомної (*Urtica dioica*)** містить комплекс біологічно активних сполук, серед яких вітаміни (К, С, В2, В3, каротиноїди), хлорофіл, дубильні речовини, органічні кислоти, флавоноїди, макро- та мікроелементи (Si, Fe, Ca, Си, K, Mp, B, Ti, Ni).

Він сприяє підвищенню рівня гемоглобіну, зниженню рівня глюкози в крові, нормалізації ліпідного обміну та підвищенню загального тонусу організму. Екстракт кореня кропиви дводомної сприяє зменшенню набряку і перешкоджає процесу збільшення передміхурової залози.

**Екстракт кори африканської сливи (*Prunus africana*)** містить низку біологічно активних речовин (фітостероли, пентациклічні тритерпени, п-докозанол та тетракозанол), які мають протизапальні та протиабляксові властивості, завдяки пригніченню продукції простагландину, зниженню рівня пролактину в передміхуровій залозі.

На основі доклінічних досліджень було висунуто кілька механізмів дії, включаючи інгібування 5-а-редукгази, а-адренергічний антагонізм, інгібування дигідростестостерону і рецепторів, що сприяють зменшенню проліферації тканин передміхурової залози.

**Пилок жита (*Secale cereale*)** має ряд ефектів, включаючи розслаблення уретри та сечового міхура, розслаблення гладких м'язів через антагонізм а-адренергічних рецепторів.

До додаткових механізмів відносяться індуkcія апоптозу в клітинах епітелію передміхурової залози та гальмування біосинтезу простагландинів та лейкотріенів.

Шляхом протизапального ефекту, пилок жита зменшує розмір передміхурової залози при ДГПЗ, простатиті та простатодинії, покращуючи такі симптоми як нікгурія та часті позиви до сечовипускання.

### **Рекомендації щодо застосування**

Рекомендовано приймати до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин та жирних кислот, з метою нормалізації функціонального стану сечовивідної системи чоловіків, при симптомах нижніх сечових шляхів, при дискомфортних відчуттях під час статевого акту, в тому числі при доброкісній гіперплазії передміхурової залози та хронічному простатиті.

**Не є лікарським засобом.**

### **Спосіб застосування та дози**

Вживати дорослим чоловікам по 1 капсулі 2 рази на добу під час прийому їжі. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

**Термін застосування:** З місяці. За необхідності курс застосування за рекомендацією лікаря повторюють.

### **Особливості застосування**

Регулярне щоденне споживання є особливо важливим для нормалізації функціонального стану передміхурової залози. Ефективність компонентів, щодо симптомів нижніх сечових шляхів, проявляється через 2-3 тижні після початку застосування. Повна ефективність може бути досягнута не раніше ніж через 3 місяці. Рекомендовано застосовувати повноцінний та збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

### **Застереження**

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C у сухому, захищенному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

## **Виробник**

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41; фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Україна, 04208, м. Київ, просп. Правди 80-В.

**ТУ У 10.8-38639061 -002:2015**