

Склад

1 капсула містить: активні інгредієнти: адеметіонін - 400 мг; допоміжна речовина: бурякові волокна (фібрекс); оболонка капсули: желатин, барвники: оксид заліза червоний, титану двоокис.

Без ГМО.

Властивості

Адеметіонін (S-аденозил-L-метіонін) — природна амінокислота, яка присутня практично у всіх тканинах організму.

Адеметіонін виконує ключову роль у метаболічних процесах організму та бере участь у таких важливих біохімічних процесах:

- трансметилювання – перенос метильних груп для синтезу фосфоліпідів клітинних мембран, нейротрансмітерів, нуклеїнових кислот, білків, гормонів тощо;
- транссульфування - участь у синтезі цистеїну, таурину, глутатіону (один з найважливіших антиоксидантів), коензиму А;
- трансамінування – участь у синтезі поліамінів, стимулюючих регенерацію клітин, проліферацію гепатоцитів.

Адеметіонін має гепатопротекторну та антидепресантну дію, його рівень впливає на стан антиоксидантної, дезінтоксикаційної, регенеруючої функції печінки.

Аделів розроблений для відновлення дефіциту і підсилення синтезу ендogenous адеметіоніну в організмі, що виникає при пошкодженнях печінки.

Аделів являє собою гепатопротектор з антидепресивною активністю; характеризується холеретичними та холекінетичними, детоксикаційними, регенеративними, антиоксидантними, антифіброзними та нейропротекторними властивостями.

Рекомендації щодо застосування

Аделів рекомендований як додаткове джерело адеметіоніну з метою нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи при внутрішньопечінковому холестазі, який може спостерігатися при:

- жировій дистрофії печінки;
- хронічному гепатиті;

- токсичних ураженнях печінки різної етіології (включаючи алкогольні, вірусні та викликані прийомом лікарських засобів);
- хронічному некалькульозному холециститі;
- холангіті;
- цирозі печінки;
- енцефалопатії, асоційованій з печінковою недостатністю (включаючи алкогольну).

Нейропротекторні властивості обумовлюють доцільність застосування Аделів при депресивних станах.

Протипоказання

Вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до компонентів.

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1-2 капсули 2 рази на добу за 1 годину до або через 2 години після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води. Тривалість прийому визначається лікарем індивідуально.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за кімнатної температури.