

Состав

действующее вещество: сангвиритрин;

1 мл раствора содержит 2 мг сангвиритрина;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость оранжевого цвета с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакологические свойства

Сангвиритрин получают из травы маклеи сердцевидной (*Macleaya cordata* (Willd.) R.Br.) и маклеи мелкоплодного (*Macleaya microcarpa* (Maxim.) Fedde) семейства маковых (*Papaveraceae*). Сангвиритрин - это смесь бисульфата двух близких по структуре и свойствам четвертичных бензофенантридиновых алкалоидов Сангвинарин и хелеритрину.

Сангвиритрин обладает широким спектром антимикробной активности, действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжеподобные и мицеллярные грибы. Активен в отношении антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. В терапевтических дозах действует бактериостатически. В основе механизма антимикробного действия препарата Сангвиритрин лежит угнетение бактериальной нуклеазы, нарушение процессов проницаемости стенок клетки, перегородок деления, строения нуклеотида.

Показания

- Как профилактическое средство: новорожденным для предотвращения гнойно-воспалительных заболеваний кожи и хирургическим больным - для профилактики раневой инфекции.
Как лечебное средство: при инфекционно-воспалительных заболеваниях

кожи и слизистых оболочек бактериальной и грибковой этиологии, включая *Candida albicans*; в стоматологии - при пародонтите, стоматите, язвенно-некротическом гингивостоматите и других поражениях слизистой оболочки полости рта; в отоларингологии - при ангине, заболеваниях среднего уха и наружного слухового прохода; в хирургии - при инфицированных ожогах, ранах, которые долго не заживают и язвах; в гинекологии - при эндоцервиците, кольпите, вагините, эрозии шейки матки; в дерматологии - при пиодермиях, поверхностных бластомикоз, дерматомикозах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, грибковые поражения с явлениями экзематизации. Заболевания печени и почек с нарушением функции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно применение в сочетании с местноанестезирующими средствами (промекаин, тримекаин).

Особенности применения

Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки глаз. При попадании раствора в глаза следует промыть их большим количеством воды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять беременным женщинам в дородовом и послеродовом периодах.

Способ применения и дозы

Препарат применять наружно и местно.

Новорожденным обрабатывать препаратом кожные складки 2 раза в сутки в течение первых 5-6 дней жизни с помощью стерильного ватного тампона.

Лечение пародонтита проводится после удаления зубных отложений и вычищение патологических десневых карманов. В десневые карманы вводить на 20 минут тонкие турунды, обильно смоченные препаратом или его водным раствором. Водный раствор препарата готовить непосредственно перед применением. Для приготовления водного раствора препарат развести в 40 раз (1 чайная ложка на 200 мл теплой кипяченой воды). Процедуру повторять ежедневно или через день. Курс лечения составляет 4-6 процедур.

При стоматитах различной этиологии в зону поражения слизистой оболочки ротовой полости делать аппликацию препарата 2-3 раза в сутки в течение 2-5 суток. Детям от 5 лет назначать полоскания теплым водным раствором препарата. Детям до 5 лет при стоматите слизистую оболочку ротовой полости смазывать водным раствором препарата.

При ангине миндалин обрабатывать препаратом 1 раз в сутки в течение 2-5 дней. Кроме того, взрослым и детям старше 5 лет ежедневно 3-5 раз в сутки назначать полоскания теплым водным раствором препарата. Детям до 5 лет этим раствором смазывать слизистую оболочку ротовой полости 3-4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения - 3-7 дней.

При наружном отите в слуховой проход вводить турунды, смоченные препаратом, на 10-15 минут 2-3 раза в сутки. Минимальный курс лечения - две недели. При хроническом гнойном среднем отите препарат закапывать взрослым по 5-8 капель 2-3 раза в сутки, детям - по 1-2 капли 3-4 раза в сутки.

Для профилактики гнойно-воспалительных осложнений рану ежедневно обрабатывать стерильным марлевым тампоном, обильно смоченным препаратом, покрыть стерильной салфеткой, смоченной им же, и наложить фиксирующую повязку. Через 3-4 суток рану повторно обработать препаратом и наложить сухую стерильную повязку. Курс определить ходом заживления раны, при неосложненном течении срок применения составляет 7-10 дней.

Для лечения инфицированных ожогов, ран и язв, долго не заживают, открытых инфицированных переломов, применять водный раствор препарата. Водным раствором препарата промыть раны и язвы, а также наложить повязки с раствором на раневую поверхность. При инфицированных ожогах перевязки делать через день, при других ранах - ежедневно 1-2 раза в сутки. Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания.

При эндоцервиците, кольпите, вагините, эрозии шейки матки делать спринцевания, орошения и примочки теплым водным раствором препарата ежедневно 1-2 раза в сутки. Курс лечения - 5-10 процедур.

При пиодермиях, поверхностном бластомикозе и дерматомикозах, в том числе осложненных смешанной флорой, препарат назначать в виде повязок или смазываемые очага поражения ежедневно 1-2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется характером и тяжестью заболевания.

Дети

Препарат можно применять детям, включая новорожденных.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов препарата. Лечение - симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая покраснение.

При применении на слизистых оболочках ротовой полости - ощущение горечи, а при применении на раневую поверхность - кратковременное ощущение жжения.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП«Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский район, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).