

Склад

1 вагінальний супозиторій містить: борна кислота- 600 мг/мг, екстракт центели азійської - 60 мг/мг.

Допоміжні речовини: гідрогенізовані тригліцериди, бджолиний віск, пропіленгліколь, токоферол

Форма випуску

Вагінальні супозиторії. Супозиторії торпедоподібної форми, гладкі та блискучі на поверхнях, жовтувато-коричневого кольору.

Властивості

Борна кислота має антисептичний ефект та проявляє фунгіцидну дію щодо дріжджових грибків роду *Candida*, а також чинить в'язучу дію на слизові оболонки.

Екстракт центели азійської проявляє протизапальну дію, сприяє регенерації та поліпшенню трофіки слизової оболонки піхви.

Рекомендації щодо застосування

Супозиторії вагінальні КАНДИБОР застосовують в комплексній терапії вагінальних грибкових інфекцій.

Супозиторії вагінальні КАНДИБОР можуть застосовуватись в поєднанні з системними протигрибковими засобами.

Перед застосуванням бажано проконсультуватись з лікарем.

Показання до використання

Рецидивуючий вульвовагінальний кандидоз.

Вульвовагінальний кандидоз, спричинений *Candida non-albicans*.

Спосіб застосування

Дотримуйтесь правил гігієни: мийте руки до і після використання засобу. Необхідно попередньо звільнити супозиторій від чарункової упаковки.

Застосовують інтравагінально на ніч по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом 14 днів.

Супозиторій потрібно ввести глибоко в піхву в положенні лежачи на спині, зігнувши ноги.

Підтримуюча схема – по 1 супозиторію двічі на тиждень, протягом 8 тижнів.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до одного з компонентів засобу. Вагітність. Період грудного вигодовування. Дитячий вік.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю не застосовують.

Особливості застосування

Не ковтати. Уникати потрапляння в очі.

При використанні засобів для місцевого застосування, особливо якщо воно тривале, можливий розвиток місцевих алергічних реакцій.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування засобу та звернутися до лікаря.

Вплив на здатність керувати автомобілем та використовувати обладнання або механізми: особливі запобіжні заходи не передбачені.

Упаковка

Супозиторії вагінальні.

По 7 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

З роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності зазначеного на упаковці.

Виробник

CYDONIA D.O.O., Lipa str. 73, 75320 Gračanica, Bosnia and Herzegovina. ЦИДОНІА Д.О.О., вул. Ліпа, 73, 75320 Грачаніца, Боснія і Герцеговина.

Ексклюзивний дистриб'ютор:

ТОВ «Євролек-Україна» 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, 7