

Состав

действующее вещество: 1 мл раствора содержит хлорофиллипта экстракта густого (10,76: 1) (экстрагент этанол 93%) - 20 мг;

вспомогательные вещества: масло кукурузное.

Лекарственная форма

Раствор в масле.

Основные физико-химические свойства: темно-зеленая маслянистая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Лекарственное средство представляет собой смесь хлорофиллов из листьев эвкалипта. Лекарственное средство обладает антибактериальной (бактериостатическим и бактерицидным) активностью в отношении стафилококков, а также антисептической и противовоспалительной активностью.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми стафилококками: эрозии шейки матки, ожоги, трофические язвы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает действие антисептических препаратов.

Особенности применения

Перед началом применения необходимо посоветоваться с врачом.

После первого применения следует сделать паузу на 6-8 часов. Курсовое лечение препаратом возможно после подтверждения отсутствия аллергической реакции на экстракт хлорофиллипта густой (вероятность отека слизистых оболочек, гиперемии в месте нанесения, зуда, высыпаний). Если появились какие-либо из приведенных симптомов, прием препарата необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не изучали, поэтому не следует применять этой категории пациентов.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применять местно, смазывая пораженные участки с помощью тампона. Продолжительность аппликаций и курс лечения определяет врач индивидуально.

При лечении эрозий шейки матки предварительно высушить тампонами все складки влагалища и влагалищной части шейки матки; смазывать препаратом канал шейки матки. Смоченный в препарате тампон оставить на шейке матки на 15-20 минут. Манипуляции проводить 1 раз в сутки в течение 10 дней. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

Дети

Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Передозировка

Возможно усиление побочных реакций.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: при применении препарата возможны аллергические реакции включая отек слизистых оболочек, гиперемия в месте нанесения, зуд, сыпь.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл во флаконе в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод» ГНЦЛС ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61057, Харьковская обл., Город Харьков, улица Воробьева, дом 8.

(Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод» ГНЦЛС »)

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).