

## **Склад**

15 мл (ml) Афлубін® Плюс Швидке полегшення містять: Алтеї сухого екстракту 143 мг (mg), Меду 750 мг (mg)

Інші інгредієнти: ксилітол, ксантан, гліцерин безводний, лимонна кислота, полуничний ароматизатор, метил-4-гідроксибензоат, пропіл-4-гідроксибензоат, вода очищена.

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей не містить штучних барвників, не містить лактози, не містить глютену, не містить алкоголю, не містить ГМО.

## **Властивості**

Цінні основні інгредієнти алтеї та меду в медичному виробі Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей діють як бальзам, вкриваючи і, тим самим, заспокоюючи запалену слизову глотки. Рослинний слиз утворює фізичне захисне покриття від сторонніх часточок, полегшуючи таким чином сухий, подразнюючий кашель і дозволяючи слизовій відновлюватися.

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей надійно та швидко полегшить будь-який, пов'язаний із застудою, сухий і вологий кашель. Крім того, Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей допомагає захистити слизову оболонку порожнини рота та глотки у разі сухості. У разі напруження голосових зв'язок, наприклад через розмову чи спів, захисний шар вкриває голосові зв'язки і забезпечує тривале полегшення таких симптомів, як кашель, першіння у горлі та неможливість відкашлятися.

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей – це сироп від кашлю, який містить в основному інгредієнти натурального походження та не містить алкоголю.

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей добре переноситься і тому підходить для дітей.

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей підходить не тільки для застосування вдень, але також ідеально підходить для застосування вночі. Завдяки своєму заспокійливому ефекту, він допомагає мати спокійний і відновлювальний сон.

**Сухий кашель - подразнюючий кашель**

Сухий кашель або подразнюючий кашель, як правило, без мокротиння, може виникати з різних причин. На початку або в кінці застудного кашлю може виникати подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Сухе повітря, сторонні часточки, такі як пил або алергени, або віруси та бактерії також можуть подразнювати слизову.

### **Вологий кашель - продуктивний кашель**

Власна слизова оболонка організму, яка підтримує бронхи у вологому стані та захищає їх від пересихання, складається з декількох складових, наприклад, мертвих клітин, різноманітних білків та лейкоцитів. У разі захворювань дихальних шляхів склад, а також колір і консистенція можуть змінюватися. Якщо спостерігається збільшення вироблення слизу, організм намагається видалити надлишок слизу з розгалуженої мережі бронхів кашлем. Слиз переміщується за допомогою кашлю в ротову порожнину, де його можна або проковтнути, або виплюнути.

Також при грудному кашлі, коли подразнюється слизова оболонка глотки, Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей допомагає заспокоїти подразнення.

### **Надійне полегшення кашлю**

Кашльовий рефлекс необхідний для очищення дихальних шляхів. Він спрацьовує, якщо є виділення і їх потрібно відкашляти. При цьому так званому продуктивному кашлі, накопичений слиз викликає кашель. Сторонні часточки також можуть активувати рецептори кашлю і викликати кашльовий рефлекс («сухий кашель»).

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей заспокоює кашльовий рефлекс на стадіях сухого та вологого кашлю, покриваючи кашльові рецептори захисним шаром.

### **Застереження**

Не приймайте Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей, якщо у вас алергія до алтеї, меду або до будь-якого з інших інгредієнтів цього медичного виробу. У разі алергічної реакції, будь ласка, припиніть застосування засобу та проконсультуйтеся з лікарем.

15 мл (ml) засобу Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей містять 2,76 г (g) ксилітолу. Калорійність ксилітолу становить 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилітол може мати проносний ефект.

## **Застосування пацієнтами з непереносимістю цукру**

Пацієнти з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози або з глюкозо-галактозною мальабсорбцією не повинні приймати цей засіб, оскільки він містить мед.

## **Застосування пацієнтам з цукровим діабетом**

15 мл (ml) медичного виробу Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей містить 0,3 ХО (хлібні (вуглеводні) одиниці).

## **Застосування під час вагітності та годування груддю**

Не рекомендується застосовувати засіб Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей під час вагітності та годування груддю.

## **Застосування дітям**

Перед застосуванням дітям віком до 3 років необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб виключити наявність більш серйозних захворювань. Не рекомендується застосовувати дітям віком до 1 року.

## **Одночасне застосування засобу Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей з іншими лікарськими засобами**

Якщо ви приймаєте інші ліки, рекомендується приймати їх за ½ години – 1 годину до або після прийому засобу Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей.

Будь ласка проконсультуйтеся з лікарем, якщо: ваші симптоми не проходять або погіршуються після 5 днів прийому; під час застосування засобу Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей виникли задишка, лихоманка або гнійна мокрота.

Засіб Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей містить метил-4-гідроксибензоат та пропіл-4-гідроксибензоат в якості консервантів. Вони можуть викликати алергічні реакції (можливо уповільненого типу).

## **Спосіб застосування та дози**

Для зручності дозування додається мірний стакан.

**Дітям віком від 6 до 11 років:** 15 мл (ml) до 4 разів на день.

**Дітям віком від 4 до 5 років:** 7,5 мл (ml) до 4 разів на день.

**Дітям віком від 2 до 3 років:** 5 мл (ml) до 4 разів на день.

**Дітям віком від 1 року:** 5 мл (ml) до 3 разів на день.

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей можна застосовувати як вдень, так і вночі.

Для досягнення кращих результатів лікування рекомендується застосовувати засіб Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей з частотою згідно рекомендацій.

Якщо є сумніви чи маєте запитання, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.

### **Умови зберігання**

Не слід використовувати цей засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці та коробці. Термін придатності відноситься до останнього дня зазначеного місяця.

Зберігати при температурі не вище 25°C. Після застосування щільно закрийте флакон. Після відкриття флакону використовуйте засіб протягом 4 тижнів.

Зберігайте флакон в оригінальній упаковці, щоб захистити від світла.

Зберігайте цей медичний виріб у недоступному для дітей місці.

Для захисту навколишнього середовища запитайте у фармацевта як утилізувати медичні вироби, які ви більше не застосовуєте. Цей захід допоможе захистити навколишнє середовище.

### **Форма випуску**

Сироп.

Афлубін® Плюс Швидке полегшення для дітей – рідина коричневого кольору. Інгредієнти натурального походження можуть спричинити утворення дрібних частинок, а колір може змінюватися від світло-коричневого до темно-коричневого. Ці можливі зміни жодним чином не впливають на якість сиропу.

По 120 мл (ml) у флаконах із коричневого скла з оригінальною герметичною кришкою, яка нагвинчується.

### **Виробник**

NÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goepfert-Str. 5, 23562 Lübeck, Germany / ХАЛСА Фарма ГмбХ, Марія-Гепперт-Штрассе 5, 23562 Любек, Німеччина