

Состав

действующее вещество: bismuth tribromophenate;

1 флакон полимерный с насадкой содержит висмута трибромфенолята (ксероформа) 10 г.

Лекарственная форма

Порошок накожный.

Основные физико-химические свойства: аморфный порошок желтого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакологические свойства

Висмута трибромфенолят (ксероформ) обладает антисептическими, вяжущими и подсушивающими свойствами. Действие препарата заключается во взаимодействии с белками тканей с образованием альбуминатов, которые подобно защитной пленке предохраняют чувствительные нервные окончания от раздражения, а также в сужении сосудов, уменьшении их проницаемости (уменьшается экссудация) и ингибирование ферментов, взаимодействие с белками микроорганизмов подавляет их жизнедеятельность.

Показания

Как вяжущее, подсушивающее и антисептическое средство при воспалительных заболеваниях кожи.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения

Не допускать попадания препарата в глаза.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Нет данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью, поэтому препарат следует назначать только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Применяют наружно. Порошок наносят на пораженные участки кожи. Срок лечения зависит от течения заболевания и устанавливается индивидуально.

Дети

Эффективность и безопасность при применении препарата детям не установлены. По этой причине его применение возможно только под наблюдением и по назначению врача.

Передозировка

Данные отсутствуют.

Побочные реакции

Не отличались. В случае появления любых нежелательных реакций лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 7 г порошка в контейнере.

По 10 г порошка во флаконе полимерном с насадкой, по 1 флакону полимерном в коробке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Исток-Плюс».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 69032, г. Запорожье, ул. Макаренка, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).