

## **Состав**

*действующее вещество: bismuth tribromophenate;*

1 флакон полимерный с насадкой содержит висмута трибромфенолята (ксероформа) 10 г.

## **Лекарственная форма**

Порошок накожный.

*Основные физико-химические свойства:* аморфный порошок желтого цвета со слабым специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

## **Фармакологические свойства**

Висмута трибромфенолят (ксероформ) обладает антисептическими, вяжущими и подсушивающими свойствами. Действие препарата заключается во взаимодействии с белками тканей с образованием альбуминатов, которые подобно защитной пленке предохраняют чувствительные нервные окончания от раздражения, а также в сужении сосудов, уменьшении их проницаемости (уменьшается экссудация) и ингибирование ферментов, взаимодействие с белками микроорганизмов подавляет их жизнедеятельность.

## **Показания**

Как вяжущее, подсушивающее и антисептическое средство при воспалительных заболеваниях кожи.

## **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлено.

### **Особенности применения**

Не допускать попадания препарата в глаза.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Нет данных относительно применения препарата в период беременности и кормления грудью, поэтому препарат следует назначать только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Применяют наружно. Порошок наносят на пораженные участки кожи. Срок лечения зависит от течения заболевания и устанавливается индивидуально.

### **Дети**

Эффективность и безопасность при применении препарата детям не установлены. По этой причине его применение возможно только под наблюдением и по назначению врача.

### **Передозировка**

Данные отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Не отличались. В случае появления любых нежелательных реакций лечение следует прекратить и проконсультироваться с врачом.

### **Срок годности**

5 лет.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше +30 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 7 г порошка в контейнере.

По 10 г порошка во флаконе полимерном с насадкой, по 1 флакону полимерном в коробке из картона.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «Исток-Плюс».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 69032, г. Запорожье, ул. Макаренка, 4.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).