

Состав

действующие вещества: 1 г мази содержит терпентин лиственницы - 54 мг, терпентиновое масло - 72 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, канифоль, воск желтый, стеариновая кислота, кислота олеиновая, полисорбат, масло розмариновое, масло эвкалиптовое, масло тимьяновый, тимол, медный комплекс хлорофиллов (Е 141).

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: светло-зеленого цвета, прозрачная, однородная мазь с характерным запахом эфирных масел и терпентинового масла.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Илон является растительным лекарственным препаратом, который способствует кровоснабжению пораженного участка кожи, снимает воспаление и оказывает дезинфицирующее действие.

Фармакокинетика

Фармакокинетические исследования не проводились.

Показания

Местное лечение гнойных воспалительных заболеваний кожи, в том числе абсцессов, фурункулов, карбункулов, панариция и воспалений потовых желез.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому вспомогательного компонента препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Необходимо учитывать возможность взаимодействия с другими препаратами для местного применения, косметическими и бытовыми химическими средствами.

Особенности применения

В случае ухудшения состояния кожи (увеличение покраснение, припухлость, боль) или общего состояния (лихорадка) следует проконсультироваться с врачом.

Избегать попадания мази в глаза.

Мазь нельзя наносить на открытые раны или при любых видах сыпи на коже.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из соображений безопасности препарат нельзя применять в период беременности и кормления грудью без назначения врача.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применять наружно, местно, взрослым пациентам. В зависимости от площади воспаления кожи нанести полоску мази длиной 2-3 см и накрыть рану стерильной повязкой. Повязку следует менять 1 или 2 раза в день. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Не применять более 10 дней.

Дети

Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому Илон не рекомендуется применять пациентам этой возрастной категории.

Передозировка

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Побочные реакции

Побочные реакции после местного применения мази Илон были слабо выраженными и преходящими. Редко ($\frac{1}{10\,000}$ до $<\frac{1}{1000}$) возникали аллергические реакции, в т. ч. зуд, отек, покраснение кожи, сыпь, жжение, которые исчезали после прекращения лечения.

Срок годности

3 года.

Срок годности после вскрытия - 3 месяца.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 25 г мази в тубе. По 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Цесра Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Браунматтштрассе 20 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).