

## **Состав**

*действующее вещество:* myramistin;

1 мл раствора содержит мирамистина 0,1 мг;

*вспомогательные вещества:* вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения.

*Основные физико-химические свойства:* бесцветная прозрачная жидкость, пенится при встряхивании.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A J.

## **Фармакодинамика**

Мирамистин оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы, резистентные к антибиотикам. Лекарственное средство эффективно в отношении грамположительных бактерий (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Streptococcus pneumoniae* и др.) и грамотрицательных бактерий (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp. и др.) действует на возбудителей заболеваний, передающихся половым путем (*Chlamydia* spp., *Treponema* spp., *Trichomonas vaginalis*, *Neisseria gonorrhoeae*), а также на вирусы герпеса, иммунодефицита человека и тому подобное. Оказывает противогрибковое действие на аскомицеты рода *Aspergillus* и рода *Penicillium*, дрожжевые грибы (*Rhodotorula rubra*, *Torulopsis gabrata* т.д.) и дрожжеподобные (*Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei* и т.д.), дерматофиты (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton schoenleini*, *Trichophyton violaceum*, *Epidermophyton Kaufman-Wolf*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum gypseum*, *Microsporum canis* и т.д.), а также на другие патогенные грибы, например, *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*), в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая грибковую микрофлору с резистентностью к химиотерапевтическим препаратам. Эффективно предотвращает инфицирование ран и ожогов, активизирует процессы регенерации. Стимулирует защитные реакции в месте применения, за счет активации поглотительной и

переваривающей функции фагоцитов, потенцирует активность моноцитарно-макрофагальной системы. Обладает выраженной гиперосмолярной активностью, вследствие чего купирует раневое и перифокальное воспаление, абсорбирует гнойный экссудат, способствуя формированию сухого струпа. Не повреждает грануляции и жизнеспособные клетки кожи, не угнетает краевую эпителизацию. Не имеет алергезирующих свойств и не оказывает местно-раздражающего действия.

## **Фармакокинетика**

При местном применении не всасывается через кожу и слизистые оболочки.

## **Показания**

*Оториноларингология:* комплексное лечение острого и хронического отита, гайморита, тонзиллита, ларингита, фарингита.

*Стоматология:* лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматита, гингивита, пародонтита, периодонтита. Гигиеническая обработка съемных протезов.

*Хирургия, травматология:* профилактика нагноений и лечение гнойных ран. Лечение гнойно-воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата.

*Комбустиология:* лечение поверхностных и глубоких ожогов II и III А степеней; подготовка ожоговых ран к дерматопластике.

*Дерматология:* лечение и профилактика пиодермии и дерматомикоза, кандидоза кожи и слизистых оболочек, микоза стоп.

*Акушерство и гинекология:* профилактика и лечение нагноения послеродовых травм, ран промежности и влагалища, послеродовых инфекций, воспалительных заболеваний (вульвовагинит, эндометрит).

*Урология:* комплексное лечение острого и хронического уретрита и уретропростатита как специфической (хламидиоз, трихомониаз, гонорея), так и неспецифической природы.

## **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к мирамистину.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении с антибиотиками, отмечено увеличение их антибактериальных и противогрибковых свойств.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Веромистин® не влияет на способность управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Поскольку резорбция лекарственного средства почти отсутствует, разрешается применять Веромистин® в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Раствор готов к применению. Применять местно взрослым.

*Хирургия, травматология, комбустиология.* С профилактической и лечебной целью Веромистином® орошать поверхность ран и ожогов, рыхло тампонировать рану и свищевые ходы, фиксировать марлевые тампоны, смоченные антисептиком. Лечебную процедуру повторять 2-3 раза в сутки в течение 3-5 дней. Эффективным является метод активного дренирования ран и полостей с суточным расходом до 1 л препарата.

*Акушерство и гинекология.* С целью профилактики послеродовой инфекции применять в виде влагалищных орошений до родов (5-7 дней), в родах после каждого влагалищного исследования и в послеродовом периоде в виде внутривлагалищных тампонов, смоченных 50 мл лекарственного средства с экспозицией 2 часа в течение 5 дней.

При родах женщин путем кесарева сечения, непосредственно перед операцией обрабатывают влагалище, во время операции - полость матки и разрез на ней, а в послеоперационном периоде вводят тампоны, смоченные лекарственным средством, во влагалище с экспозицией 2 часа в течение 7 дней. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов проводить курсом в течение 2 недель, путем внутривлагалищного введения тампонов с лекарственным средством, обработки кожи наружных половых органов, а также с помощью электрофореза.

*Дерматология.* Лечение кандидомикоза кожи и слизистых оболочек, микоза стоп и крупных складок осуществлять путем аппликаций 2-4 раза в сутки.

*Оториноларингология.* При гнойных гайморитах во время пункции верхнечелюстную пазуху промывать достаточным количеством препарата. При лечении тонзиллита, фарингита и ларингита проводить полоскание горла раствором Веромистина® 3-4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на одно полоскание составляет 10-15 мл. При отитах тампон, смоченный лекарственным средством, вводить в наружный слуховой проход 4-6 раз в сутки в течение 10-14 дней.

*Стоматология.* При лечении пародонтитов раствор мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на десны в течение 15 минут. При обострениях проводить промывание Веромистином® пародонтальных карманов с помощью шприца и вводить в полость абсцесса турунды с лекарственным средством. После проведения вестибулопластики и френуlectомии лекарственное средство применять в виде ванночек в амбулаторных условиях. При стоматите, гингивите рекомендуется полоскание ротовой полости 10-15 мл лекарственного средства 3-4 раза в сутки. С целью гигиенической обработки съемных протезов оставлять их на ночь в растворе мирамистина, перед использованием протезы тщательно промывать проточной водой.

*Урология.* В комплексном лечении уретрита и уретропростатита проводят впрыска в уретру 2-3 мл препарата 1-2 раза в день, курс - 10 дней.

## **Дети**

Поскольку нет достаточного опыта применения раствора мирамистина для лечения детей, его не следует применять в педиатрической практике.

## **Передозировка**

Явления передозировки не наблюдалось.

## **Побочные реакции**

В отдельных случаях возможно кратковременное ощущение жжения, исчезающее самостоятельно через 15-20 секунд и не требует отмены препарата. Реакции гиперчувствительности, в частности явления местного раздражения кожи: зуд, гиперемия, жжение, сухость кожи.

## **Сообщение о подозреваемых побочных реакциях.**

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет

продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 400 мл во флаконах.

### **Категория отпуска**

По рецепту.

### **Производитель**

ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).