Состав

действующее вещество: ethanol;

1 флакон содержит не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и воду.

Лекарственная форма

Раствор спиртовой для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся, гигроскопическая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.

Фармакодинамика

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Для хирургической обработки рук хирургов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Острые воспалительные процессы кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особенности применения

В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение лекарственного средства и смыть жидкость водой. Не допускать попадания препарата в глаза.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно - для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в т. ч. рук.

Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1: 1.

Дети

Применять по назначению врача.

Передозировка

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

Побочные реакции

При местном применении возможно раздражение кожи или слизистых оболочек.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в флаконах.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.