

## **Состав**

*действующее вещество:* этанол;

содержит при температуре 20 °С не менее 69,3 % об/об и не более 70,7 % об/об этанола и воду.

## **Лекарственная форма**

Раствор для внешнего применения.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.

## **Фармакодинамика**

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

## **Фармакокинетика**

При местном применении не всасывается через кожу.

## **Показания**

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Хирургическая обработка рук хирургов.

## **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.

## *Особые меры безопасности*

В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой.

Не допускать попадания препарата в глаза!

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Наружно – для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук.

Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.

### **Дети**

Применяют по назначению врача.

### **Передозировка**

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

### **Побочные реакции**

При местном применении возможны раздражения кожи или слизистых оболочек.

В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

### **Срок годности**

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 100 мл во флаконе.

### **Категория отпуска**

По рецепту.

### **Производитель**

ПАО «Галичфарм».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).