

Склад

1 супозиторій містить: дарексіну 2,3 г.

Супозиторії жовтого кольору, конусної форми.

Властивості

Дарексін має регенеруючу, протизапальну, антибактеріальну та імуномодулюючу дію, сприяє швидкому загоєнню ран, тріщин, ерозій. Володіє репаративною дією.

До складу Дерексіна входить декспантенол, який переходить в організмі в пантотенову кислоту, яка є складовою частиною коферменту А і бере участь в процесах ацетилювання, вуглеводному і жировому обміні, у синтезі ацетилхоліну, кортикостероїдів, порфіринів; стимулює регенерацію шкіри, слизових оболонок, нормалізує клітинний метаболізм, прискорює мітоз і збільшує міцність колагенових волокон.

Ацетилхолін, як нейрогуморальний трансмітер парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, підтримує нормальну секреторну і кінетичну функції кишечника. Надає регенеруючу, метаболічну та слабку протизапальну дію.

До складу Дерексіну входить комплекс йоду та полімеру полівінілпіролідону, що виділяє йод протягом певного часу після його нанесення на шкіру.

Елементарний йод проявляє сильну бактерицидну дію, має широкий спектр протимікробної дії щодо бактерій, вірусів, грибків та найпростіших мікроорганізмів.

Механізм дії: вільний йод здійснює швидкий бактерицидний ефект, а полімер є депо для йоду. При контакті зі шкірою та слизовими оболонками з полімера виділяється значна кількість йоду. Йод реагує з окислювальними-сульфідними (SH) та гідроксильними (ОН)-групами амінокислот, що входять до складу ферментів і структурних білків мікроорганізмів, інактивуючи або руйнуючи ці білки. Більшість мікроорганізмів знищуються при дії *in vitro* менш ніж за хвилину, а основна руйнівна дія відбувається у перші 15-30 секунд. При цьому йод знебарвлюється, у зв'язку з чим зміна насиченості коричневого кольору є індикатором його ефективності.

Активна речовина Дерексіна супозиторії має широкий антимікробний спектр дії, а саме - діє на грампозитивні та грамнегативні бактерії (бактерицидний), на

віруси (віруліцидний), на грибки (фунгіцидний) та спори грибків (спорицидний), а також на деяких простіші мікроорганізми (протозойний). Завдяки механізму дії резистентність на Дарексін, у тому числі вторинна резистентність при довготривалому застосуванні не очікується.

Показання до використання

Призначений для підтримки в фізіологічних межах функціонального стану людини при використанні в якості стимулюючих, тонізуючих композицій.

В гінекології: вагініти, кольпіти, аднексити, ерозії шийки матки, міоми матки.

В проктологи: геморої, тріщини заднього проходу, сигмоїдити, поліпоз.

В урології: аденома передміхурової залози, простатити (бактеріальні), цистити, уретрити.

Протипоказання

Непереносимість йоду.

Не приймати дітям до 16 років.

Спосіб застосування

Вводиться в пряму кишку або піхву після очисної клізми або спринцювання по 1-2 супозиторії на добу.

Передозування

Симптоми передозування невідомі. У випадку перевищення дози рекомендується промивання шлунку або піхви і симптоматичне лікування.

Застереження

Перед застосуванням рекомендована консультація з лікарем.

Не перевищувати рекомендованої дози.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла та закритих джерел тепла місці, при температурі від 4°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 5 супозиторій у блістері, по 2 блістера в картонній коробці.

Не є лікарським засобом.