

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 г препарата содержит висмута трибромфенолята (Ксероформа) (в пересчете на 50 % висмута оксид и сухое вещество) 30 мг, дегтя березового 30 мг;

*вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный безводный, масло касторовое.

## **Лекарственная форма**

Линимент.

*Основные физико-химические свойства:* линимент от слабо-желтоватого до бурого или до бурого с зеленоватым или синеватым оттенком цвета, со специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТХ D08A X.

## **Фармакодинамика**

Бальзамический линимент по Вишневскому оказывает дезинфицирующее, противовоспалительное, слабое раздражающее действие на рецепторы тканей благодаря входящим в его состав компонентам. Препарат способствует ускорению процесса заживления ран, нормализуя кровоснабжение тканей.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

- Абсцессы;
- фурункулы;
- пролежни;
- лимфадениты;
- лимфангиты;
- ожоги;
- отморожения;

- трофические язвы.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к фенолу и его производным;
- повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении на тех же участках кожи с другими препаратами для наружного применения могут создаваться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

## **Особенности применения**

Перед началом применения следует посоветоваться с врачом!

Линимент предназначен только для наружного применения. Перед наложением повязки рану следует очистить от некротических тканей, раскрыть пузыри, промыть антисептическим раствором.

Не следует допускать попадание линимента на слизистые оболочки. Руки после нанесения средства следует тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот. В случае попадания – промыть большим количеством воды.

Деготь березовый, входящий в состав бальзамического линимента, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому летом следует избегать пребывания на солнце в период лечения препаратом.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся какие либо нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего лечения.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Нет информации касательно влияния препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Поскольку безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучалась, назначать его следует с учетом соотношения

польза/риск.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым линимент применять наружно по назначению врача. Наносить 2-3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи или накладывать повязку в 5-6 слоев марли, пропитанную препаратом. Повязку фиксировать, менять 1 раз в 2-3 дня.

Перевязки проводить до полного очищения инфицированного участка кожи. Длительность курса лечения – от 6 до 20 дней.

### **Дети**

Безопасность и клиническую эффективность препарата в этой возрастной категории не изучали.

### **Передозировка**

Возможны проявления местной аллергической реакции (в т.ч. высыпание, зуд), которые требуют проведения противоаллергической терапии.

Лечение: в случае случайного проглатывания большого количества геля следует вызвать рвоту и обратиться к врачу. Терапия симптоматическая.

### **Побочные реакции**

При длительном применении возможно появление местной аллергической реакции (в т.ч. гиперемия, зуд, кожные высыпания, включая крапивницу, отеки), требующие проведения противоаллергической терапии. Возможны реакции фотосенсибилизации.

В случае возникновения каких либо негативных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего лечения!

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 40 г в тубе и пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр  
«Борщаговский химико-фармацевтический завод».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —  
[Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).