

## **Состав**

*действующие вещества:* формальдегид, этанол;

100 мл раствора содержат: раствора формальдегида 35% - 10 г, этанола 96% - 39,5 г;

*вспомогательные вещества:* одеколон, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения, спиртовой.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная, бесцветная жидкость с ароматным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Дерматологические препараты. Средства, применяемые при гипергидрозе. Код АТХ D11A A.

## **Фармакодинамика**

Препарат оказывает дезинфицирующее и дезодорирующее действие.

## **Показания**

Формидрон применяют для обработки кожи при повышенной потливости.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания кожи. Возраст до 14 лет.

## **Особые меры безопасности**

С осторожностью назначают больным пожилого возраста и в период беременности. Не наносить на лицо с целью предотвращения раздражения. Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не описано.

## **Особенности применения**

Резкое покраснение и зуд кожи после нанесения препарата свидетельствуют об индивидуальной повышенной чувствительности к последнему и требуют немедленного прекращения применения препарата.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Применяют наружно. Взрослые и дети старше 14 лет протирают кожу ватным тампоном, смоченным препаратом, 1 - 2 раза в сутки.

## **Дети**

Не применяется у детей до 14 лет.

## **Передозировка**

Не следует допускать передозировки препарата. При длительном и частом применении в случае покраснения, зуда, раздражения, являются признаками передозировки, необходимо прекратить лечение препаратом. Препарат смыть водой с кожных покровов. Терапия симптоматическая.

## **Побочные реакции**

Раздражение кожи, аллергические реакции, зуд.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

### **Срок годности**

4 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 мл во флаконе.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «Тернофарм».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).