

Склад

Дієтична добавка

Склад: 1 капсула містить: активні інгредієнти: сухого екстракту з коріння мартинії запашної (*extractum Harpagophytum procumbens siccum*) (5:1) – 240 mg (mg), неденатурованого хрящового колагену II типу – 10 mg (mg), метилсульфонілметану Opti MSM® – 250 mg (mg); допоміжні речовини: стеарат магнію (антиспікаючий агент), оболонка капсули: желатин, барвники оксид заліза червоний, титану діоксид.

Без ГМО.

Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо застосування

Артімар рекомендований з метою нормалізації функціонування суглобів та кісток при гострих і хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату, таких як:

- запальні захворювання опорно-рухового апарату (артрити, тендиніти, тендовагініти);
- дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів (коксартрози, гонартрози, спондилоартрози та інші);
- захворювання, що супроводжуються болем у спині;
- остеохондроз та остеохондропатія;
- ураження суглобів аутоімунного генезу;
- як хондропротектор для запобігання уражень суглобів при інтенсивних навантаженнях (спорт, важкі види робіт).

Сухий екстракт з коріння мартинії запашної (*extractum Harpagophytum procumbens siccum*) (5:1) має протизапальний та знеболювальний ефект, що обумовлений комплексною дією активних речовин, які інгібують медіатори запалення (цитокіни), а також медіатори деструкції хряща: TNF- α , IL-1 β та еластазу, сприяють супресії матриксних металопротеїназ у хондроцитах, перешкоджають утворенню оксиду азоту (NO), що сповільнює розвиток запальних процесів.

Неденатурований хрящовий колаген II типу являє собою глікозилзовану форму неденатурованого колагену, отриманого з хряща курячої грудки. У неденатурованого колагену II типу збережена тривимірна природна конфігурація самої молекули та наявність активних епітопів (специфічні частини антигену, з

якими зв'язуються антитіла). Неденатурований колаген II типу стримує дію клітин Т-кілерів, які внаслідок порушення імунної відповіді, атакують колаген власного організму, сприяючи запаленню. Прийом всередину неденатурованого колагену знижує аутоімунну відповідь до власного колагену II типу в організмі, що призводить до зменшення запалення при дегенеративних та аутоімунних захворюваннях суглобів. Колаген II типу при тривалому застосуванні підтримує хрящову тканину суглобів, забезпечує їх рухливість і гнучкість, зменшує дискомфорт. Неденатурований колаген II типу сприяє утворенню спеціалізованих регуляторних Т-лімфоцитів (Т-регулятори), які здатні продукувати протизапальні цитокіни, такі як інтерлейкін-10 (ІЛ-10), інтерлейкін-4 (ІЛ-4) та трансформуючий фактор росту- β (TGF- β). Дані цитокіни здатні проникати у синовіальну рідину суглоба через кровоносну систему синовіальної оболонки та субхондральної кістки. Протизапальні цитокіни ІЛ-10, ІЛ-4, TGF- β здатні пригнічувати запалення та покращувати метаболізм хрящової тканини. ІЛ-10 чинить вплив на рецептори макрофагів і синовіоцитів, інгібуючи вивільнення інтерлейкіну-1 (ІЛ-1). TGF- β стимулює синтез міжклітинної речовини (матрикс) хряща за рахунок пригнічення катаболічної активності хондроцитів й активації анаболічної функції та проліферації хондроцитів. Крім того, ІЛ-10 і TGF- β сприяють збільшенню продукції інтерлейкіну-4 (ІЛ-4). Це сприяє перемиканню метаболізму хондроцитів у бік синтезу компонентів міжклітинного матриксу.

Метилсульфонілметан Opti MSM® – запатентована і очищена за допомогою чотиріступінчастого процесу дистиляції форма метилсульфонілметану.

Метилсульфонілметан відіграє важливу роль у підтримці еластичності і гнучкості сполучної тканини, має виражений протизапальний ефект при патології опорно-рухового апарату, підвищує фізичну витривалість, а також значно зменшує дискомфорт у м'язах після фізичного навантаження і занять спортом.

Метилсульфонілметан бере участь у формуванні сполучної тканини, біосинтезі колагену, що сприяє еластичності шкіри і зміцненню м'язів, допомагає більш швидкому загоєнню ран, надає позитивний ефект на стан шкіри і волосся.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 2 капсули двічі на добу за 1 годину до або через 2 години після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Термін вживання

Тривалість прийому визначається лікарем індивідуально.

Застереження

Артімар не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням обов'язкова консультація лікаря.

Протипоказання

Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, індивідуальна чутливість до компонентів дієтичної добавки, дитячий вік, вагітність та період лактації.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за кімнатної температури.

Форма випуску

Капсули тверді.

Упаковка

Кількість капсул в упаковці: вказано на упаковці.

Маса вмісту 1 капсули: 507 mg (мг) \pm 10 %.

Загальна маса 1 капсули: 603 mg (мг) \pm 10 %.

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці

Виробник

24 місяці від дати виробництва.