

Склад

- Гінкго білоба - 20 мг;
- Вітамін А (ретинол) - 600 МО
- Залізо - 5 мг
- Кальцій - 40 мг
- Вітамін D3 (холекальциферол) - 50 МО
- Калій - 10 мг
- Вітамін С (аскорбінова кислота) - 25 мг
- Магній - 5 мг
- Риб'ячий жир - 2,5 мг

Допоміжні речовини: лимонна кислота 10 мг, сорбат калію 5 мг, бензоат натрію 5 мг, ароматизатор малини 10 мг, ксантан 20 мг, суклароза 1 мг, глюкоза 5 мг, вода 4836,5 мг.

Форма випуску

Сироп для перорального застосування, флакон 120 мл, у картонній упаковці.

Фармакологічні властивості

Нейрокідс містить біологічно активні речовини (флавонові глікозиди, терпенові лактони) з екстракту листя гінкго білоба, що зміцнюють судинну стінку та підвищують її еластичність, покращують реологічні властивості крові.

Дія Нейрокідс є сукупною дією його компонентів. Нормалізує метаболізм у клітинах, запобігає агрегації еритроцитів, інгібує фактор активації тромбоцитів, розширює дрібні артерії, підвищує тонус вен, регулює наповнення судин. В результаті покращується мікроциркуляція, надходження кисню та глюкози до мозку та периферичних тканин.

Нейрокідс має стимулюючий ефект на обмін речовин кори головного мозку, стимулює активність мозку і розвиток пам'яті, покращує кровообіг в головному мозку, підвищує забезпечення харчуванням нервових клітин, видалення продуктів метаболізму. М'який нейростимулюючий ефект знижує занепокоєння і допомагає при лікуванні підгострих депресивних станів.

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендований лікарем як допоміжний засіб при лікуванні таких станів:

- порушення мозкового кровообігу
- розлади уваги і (або) пам'яті
- зниження інтелектуальних здібностей
- астеничні стани (психогенні або невротичні)
- перенапруження і втома
- нейросенсорні порушення (запаморочення, шум у вухах)
- затримка психічного і фізичного розвитку дітей
- підгострі депресивні стани і підвищена тривожність.

Спосіб застосування

Для дітей до 6 років використовувати шприц-дозатор.

- 3 місяці - 1 рік 1 мл 2 рази на день;
- 1-2 роки – 2 мл 2 рази на день;
- 2-4 роки – 3 мл 2 рази на день;
- 4-6 років – 4 мл 2 рази на день;

Діти шкільного віку:

- 6-14 років – по 5 мл (одна чайна ложка) 2 рази на день;
- з 14 років – по 10 мл (дві чайні ложки) 2 рази на день.

Приймати після їди. Останній прийом – не пізніше, ніж за три години до сну.

Курс прийому - 1-3 місяці.

Перед прийомом препарату добре збовтайте!

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів, цукровий діабет, ексудативний діатез.

Побічні ефекти

Порушення сну у випадку прийому на ніч, індивідуальна непереносимість компонентів, алергічні реакції на компоненти.

Термін придатності

Зазначений на коробці. Не приймайте препарат після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15°C до 25°C.

Виробник

ТОВ «Синерджілаб», вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, 01030, Україна