

## **Состав**

*действующее вещество:* мочевины;

1 мл кожной эмульсии содержит 20 мг мочевины;

*вспомогательные вещества:* кислота лимонная, моногидрат (Е 330); натрия цитрат; динатрия эдетата; Cosmocil CQ (20% водный раствор полигексанида); ПЭГ-6 стеарат; макроголу стеарат; масло минеральное легкое; диметикон 350; ароматизатор Mirage Y; вода очищена.

## **Лекарственная форма**

Эмульсия накожная.

*Основные физико-химические свойства:* жидкая гомогенная эмульсия белого цвета с характерным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты со смягчающим и защитным действием.

Код АТХ D02A E01.

## **Фармакодинамика**

Мочевина является натуральным увлажняющим фактором ороговелого слоя эпидермиса.

Она оказывает влияние на связывание воды внутриклеточных белков. Она не растворяет кератин, но смягчает его. Концентрация мочевины в препарате не приводит к раздражению кожи и повышает барьерную функцию эпидермиса. Вспомогательные вещества формируют эмульсию типа масла в воде, содержащую 11% липидов.

## **Показания**

Лечение и защита раздраженной или чувствительной кожи нормального и умеренно сухого типа; как дополнительное местное лечение заболеваний кожи, а также для ухода за кожей в периоды ремиссии.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Исследования по изучению взаимодействия не проводились.

Мочевина может усиливать абсорбцию других лекарственных средств, в частности, кортикостероидов, дитранола и 5-фторурацила.

### **Особенности применения**

Только для кожного применения. Не следует наносить на поврежденную кожу или открытые раны.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Разрешается применять лекарственное средство в период беременности или кормления грудью.

Кормящие женщины должны перед кормлением удалить препарат с участков груди.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям применять 2-3 раза в день. Препарат наносить на пораженные участки кожи. Обычно лечение длится не больше 6 недель. Если в течение нескольких дней с начала лечения не происходит улучшения или симптомы ухудшаются, следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

### **Дети**

Особенностей применения детям нет. Разрешается применение детям в возрасте от 12 месяцев.

### **Передозировка**

Неизвестно.

## **Побочные реакции**

Случаи побочных реакций у пациентов, лечившихся данным препаратом, указаны в таблице ниже.

Частота развития побочных эффектов определялась следующим образом: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq 1/100$  и  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1000$  и  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10000$  и  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10000$ ), частота неизвестна (не может быть оценена по доступным данным).

<b>Классы систем органов</b>	<b>Частота</b>	<b>Побочная реакция</b>
Со стороны кожи и подкожных тканей	Частота неизвестна	Эритема, жжение, зуд, сыпь
Со стороны иммунной системы	Редко	Повышенная чувствительность

Лечение следует отменить, если у пациента развились эритема, жжение, зуд, сыпь или повышенная чувствительность после применения препарата.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° C в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 200 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Шпириг Фарма АГ/Spirig Pharma AG.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Фрошакерштрассе 6, 4622 Эгеркинген, Швейцария/Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, Switzerland.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).