

Состав

действующие вещества: 1 г сбора содержит мать-и-мачехи листья (*Farfarae folia*) 400 мг, подорожника большого листья (*Plantaginis majoris folia*) 300 мг, солодки корней (*Glycyrrhizae radices*) 300 мг.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков зеленого, буровато-зеленого, беловато-серого и светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A10.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие и действие, которое смягчает кашель, усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и отхождению мокроты, уменьшают кашель.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, артериальная гипертензия, органические поражения сердца, ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Данные отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не установлена.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не рекомендуется применять.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по ½ стакана, детям 12-14 лет - по ¼ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1 стакану, детям 12-14 лет - по ½ стакана, 7-12 лет - по ¼ стакана, 3-7 лет - по 2 столовые ложки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Возможно развитие аллергических реакций.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., Г.. Житомир, шоссе Киевское, дом. 21.