

Склад

В 1 таблетці міститься 750 мг стандартизованого екстракту Tribulus Terrestris (не менше 45% фураностанолових сапонінів); 25 мг екстракту пажитника сінного ; допоміжні речовини : мікрокристалічна целюлоза, кальцію стеарат, лактоза.

Показання до використання

- Стимулює репродуктивну функцію
- підсилює секрецію статевих гормонів в межах фізіологічних норм (у чоловіків підвищує концентрацію ЛГ і тестостерону, у жінок — естрадіолу і ФСГ, практично не змінюючи рівень тестостерону)
- допомагає позбутися від сексуальних розладів
- стимулює сперматогенез
- фригідність
- покращує якість і кількість сперми
- покращує роботу центральної нервової системи
- активізує кровообіг в органах малого тазу
- нормалізує менструальний цикл
- відновлює овуляцію
- зменшує симптоматику клімаксу у жінок
- знижує стомлюваність і дратівливість
- нормалізує обмін холестерину та інших жирів

Трібулат призначають для профілактики і лікування (самостійно або у комплексній терапії) розладів статевої системи у чоловіків і жінок. При еректильній дисфункції чоловікам - для посилення лібідо, сили і тривалості ерекції. В якості монотерапії або в комплексній терапії певних форм безпліддя у чоловіків: безпліддя на базі ідіопатичної олігоастенотератоспермії (зменшення кількості і зниження якості сперматозоїдів у виділеній спермі); безпліддя за відсутності поліпшення спермальних показників впродовж 1 року після операції з приводу варикоцеле; імунологічно обумовлене безпліддя. Tribulus Terrestris стимулюють роботу гіпоталамуса і гіпофіза, і сприяє посиленню вироблення лютеотропина (пептидний гормон), що приводить в норму роботу репродуктивної системи. Приймаючи Трібулат, відбувається стимуляція статевих залоз і приходить в норму гормональний фон.

Жінкам з клімактеричним і посткастраційним синдромом з виявленими нейровегетативними і нейропсихічними проявами; при ендокринному яєчниковому безплідді. Tribulus Terrestris, завдяки їх властивостям відновлювати баланс вироблення естрогену, прогестерону і тестостерону жіночим організмом

завдяки чому нормалізує менструальний цикл. При порушенні жирового обміну (дисліпопротеїнемії) для зниження загального ХС і ЛПНП.

Спосіб застосування та дози

Вживати по 1 таблетці 2 рази на добу, після їжі. При зниженні лібідо, імпотенції та безплідді у чоловіків - тривалість застосування - не менше 90 днів. При ендокринній безплідності у жінок - по 1 таблетці 2 рази на добу з 1-го по 12-й день менструального циклу. Курс лікування можна повторювати до отримання позитивного терапевтичного ефекту (до настання вагітності).

При дисліпопротеїнемії - рекомендоване дозування по 1 таблетці 2 рази на добу. Тривалість лікування - не менше 90 днів.

Клімактеричний і посткастраційний синдром у жінок. По 1 таблетці 3 рази на добу протягом 60-90 днів. Після поліпшення стану поступово переходять на підтримуючу дозу - по 1 таблетці на добу протягом 1-2 років.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату; при важких серцево-судинних і ниркових захворюваннях; період вагітності та годування груддю. Не рекомендується призначати пацієнтам віком до 18 років.

Побічні ефекти

Можливі реакції підвищеної чутливості. При прийомі препарат може надавати подразнюючу дію на слизову оболонку шлунка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Одночасне застосування ТРИБУЛАТА з лікарськими засобами, що стимулюють овуляцію у жінок, веде до взаємного посилення ефектів. Одночасне застосування з діуретиками може підсилити ефект останніх та потенціювати гіпотензивну дію гіпотензивних препаратів.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25° С.

Термін вживання

2 роки.