

## **Состав**

*действующее вещество:* настойка плодов софоры японской (Fructus Sophorae japonicae) (1:2) (экстрагент - этанол 48%);

1 флакон содержит настойки плодов софоры японской (Fructus Sophorae japonicae) (1:2) (экстрагент - этанол 48%) 20 мл или 25 мл, или 40 мл.

## **Лекарственная форма**

Настойка.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость бурого цвета. Допускается образование осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах софоры японской (рутин, софорозид, генистеин, кемпферол, кверцетин и другие вещества), обуславливают противовоспалительное, антимикробное и трофическое действие препарата, уплотняют стенки сосудов и уменьшают их ломкость.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Гнойные воспалительные процессы (раны, трофические язвы).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Пока не известна.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом и выполнять другую работу, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, настойку не рекомендуется применять женщинам в период беременности и кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Применяют наружно взрослым и детям старше 12 лет при раневых процессах - в форме аппликаций под повязку и орошений. Курс лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффективности препарата, а также от характера лечения (монотерапия или терапия в комплексе с другими лекарственными средствами).

## **Дети**

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

Не установлено.

## **Побочные реакции**

Аллергические реакции, включая покраснение, сыпь на коже, зуд.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 40 мл во флаконах, укупоренных пробкой и крышкой или пробкой-капельницей и крышкой.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).